

# *Algebra & Number Theory*

Volume 9

2015

No. 10

**Induction parabolique et  $(\varphi, \Gamma)$ -modules**

Christophe Breuil



# Induction parabolique et $(\varphi, \Gamma)$ -modules

Christophe Breuil

Soit  $L$  une extension finie de  $\mathbb{Q}_p$  et  $B$  un sous-groupe de Borel d'un groupe réductif déployé connexe  $G$  sur  $L$  de centre connexe. On définit un foncteur contravariant et exact à droite de la catégorie des représentations lisses de  $B(L)$  sur  $\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z}$  vers la catégorie des limites projectives de  $(\varphi, \Gamma)$ -modules étales (pour  $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p)$ ) sur  $\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z}$ . On montre que ce foncteur est insensible à l'induction parabolique et que, restreint aux représentations de longueur finie dont les constituants sont des sous-quotients de séries principales, il est exact et donne de "vrais"  $(\varphi, \Gamma)$ -modules. Par passage à la limite projective, on en déduit que, convenablement normalisé, il envoie la  $G(\mathbb{Q}_p)$ -représentation  $\Pi(\rho)^{\text{ord}}$  de Breuil et Herzig (*Duke Math. J.* **164**:7 (2015), 1271–1352) vers le  $(\varphi, \Gamma)$ -module de la représentation  $(L^\otimes|_{\widehat{B}_{C_p}})^{\text{ord}} \circ \rho$  de  $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p)$ , reliant ainsi les deux constructions de *loc. cit.*

Let  $L$  be a finite extension of  $\mathbb{Q}_p$  and  $B$  a Borel subgroup of a split reductive connected algebraic group  $G$  over  $L$  with a connected center. We define a right exact contravariant functor from the category of smooth representations of  $B(L)$  over  $\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z}$  to the category of projective limits of étale  $(\varphi, \Gamma)$ -modules (for  $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p)$ ) over  $\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z}$ . We show that this functor is insensitive to parabolic induction and that, when restricted to finite length representations with all constituents being subquotients of principal series, it is exact and yields "genuine"  $(\varphi, \Gamma)$ -modules. By a projective limit process, we deduce that, conveniently normalized, it sends the  $G(\mathbb{Q}_p)$ -representation  $\Pi(\rho)^{\text{ord}}$  of Breuil and Herzig (*Duke Math. J.* **164**:7 (2015), 1271–1352) to the  $(\varphi, \Gamma)$ -module of the representation  $(L^\otimes|_{\widehat{B}_{C_p}})^{\text{ord}} \circ \rho$  of  $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p)$ , thus connecting the two constructions of *loc. cit.*

---

Je remercie pour leur soutien le CNRS, l'université Paris-Sud et le projet ThéHopaD ANR-2011-BS01-005. Je remercie Benjamin Schraen et Stefano Morra pour m'avoir informé de leurs travaux en cours [Schraen 2012–14; Morra et Schraen  $\geq$  2015] qui, avec [Schraen 2015], ont joué un rôle très important dans la gestation de cet article. Le travail en collaboration avec Florian Herzig [Breuil et Herzig 2015], ainsi que les dévissages astucieux de Julien Hauseux [2014], ont aussi eu une influence décisive.

*MSC2010* : primary 11S20; secondary 20G25, 20G05.

*Mots-clefs* :  $p$ -adic Langlands, parabolic induction,  $(\text{phi}, \text{Gamma})$ -modules.

1. Introduction	2242
2. Les $A[[X]][[F]]$ -modules de torsion sur $A[[X]]$	2246
3. Un foncteur vers les (pro-) $(\varphi, \Gamma)$ -modules	2251
4. Indépendance des choix	2256
5. Compatibilité au produit tensoriel	2259
6. Le cas des induites paraboliques I	2267
7. Le cas des induites paraboliques II	2272
8. Le cas des $H^i(N_1, C_w(\pi_B))$ pour $i \geq 1$	2278
9. Quelques conséquences	2283
Bibliographie	2290

## 1. Introduction

Soit  $p$  un nombre premier,  $L$  une extension finie de  $\mathbb{Q}_p$  et  $B$  un sous-groupe de Borel d'un groupe algébrique réductif déployé connexe  $G$  sur  $L$  de centre connexe. L'objectif de cet article est d'une part de construire un foncteur de la catégorie des représentations lisses de  $B(L)$  sur des  $\mathcal{O}_E/(\varpi_E^m)$ -modules (où  $E$  est une extension finie quelconque de  $\mathbb{Q}_p$  d'anneau d'entiers  $\mathcal{O}_E$ ,  $\varpi_E \in \mathcal{O}_E$  une uniformisante et  $m \geq 1$  un entier fixé) vers les pro- $(\varphi, \Gamma)$ -modules étales sur  $\mathcal{O}_E/(\varpi_E^m)$  (= les limites projectives de  $(\varphi, \Gamma)$ -modules étales usuels pour  $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p)$  à coefficients dans  $\mathcal{O}_E/(\varpi_E^m)$ ), d'autre part de montrer que ce foncteur, convenablement tordu et après un passage à la limite projective, envoie la  $G(\mathbb{Q}_p)$ -représentation  $\Pi(\rho)^{\text{ord}}$  de [Breuil et Herzig 2015, §3.4] (pour  $\rho$  une représentation de  $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p)$  sur  $E$  "générique ordinaire" comme dans [loc. cit.]) vers le  $(\varphi, \Gamma)$ -module du dual de la représentation  $(L^\otimes|_{\widehat{B}_{C_p}})^{\text{ord}} \circ \rho$  de  $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p)$  ([Breuil et Herzig 2015, §2.5]), réalisant ainsi l'un des espoirs de [Breuil et Herzig 2015].

Rappelons brièvement l'histoire, encore courte, du sujet. Il a été très tôt remarqué (voir, e.g., [Breuil 2003]) que la correspondance de Langlands modulo  $p$  pour  $\text{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$  devait attacher aux représentations réductibles de dimension 2 de  $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p)$  des représentations lisses de  $\text{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$  également réductibles et génériquement de longueur 2 (en fait des extensions - éventuellement scindées - entre deux séries principales), montrant ainsi une différence fondamentale d'avec la correspondance locale classique. Ce phénomène a été expliqué par Colmez qui a construit dans [Colmez 2010] un foncteur exact de la catégorie des représentations lisses de longueur finie de  $\text{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$  sur des  $\mathcal{O}_E/(\varpi_E^m)$ -modules (la définition ne nécessite en fait que l'action du Borel  $B(\mathbb{Q}_p)$ ) vers la catégorie des  $(\varphi, \Gamma)$ -modules étales sur  $\mathcal{O}_E/(\varpi_E^m)$ , qui elle-même par un résultat de Fontaine [1990] est équivalente à la catégorie des représentations de longueur finie de  $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p)$  sur des  $\mathcal{O}_E/(\varpi_E^m)$ -modules. Ce foncteur exact envoie une série principale de  $\text{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$  vers

un caractère de  $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p)$ , et donc une extension entre deux séries principales vers une représentation réductible de dimension 2 de  $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p)$ . Un peu plus tard, Schneider et Vignéras [2011] ont proposé un  $\delta$ -foncteur étendant les constructions de [Colmez 2010] à un groupe algébrique réductif déployé connexe  $G$  comme au début, mais à valeurs dans des catégories de  $(\varphi, \Gamma)$ -modules à plusieurs variables. Malgré quelques résultats (voir, e.g., [Zábrádi 2011; Ollivier 2014]), le  $\delta$ -foncteur de Schneider et Vignéras reste à ce jour plutôt mystérieux.

Dans [Breuil et Herzig 2015], les auteurs ont associé à une représentation modulo  $p$  (resp.  $p$ -adique) suffisamment générique  $\rho$  de dimension  $n$  de  $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p)$  à valeurs dans le Borel une représentation modulo  $p$  (resp. continue unitaire  $p$ -adique) de longueur finie  $\Pi(\rho)^{\text{ord}}$  de  $\text{GL}_n(\mathbb{Q}_p)$  dont les constituants sont tous des séries principales (en fait la construction de  $\Pi(\rho)^{\text{ord}}$  est valable avec un groupe réductif déployé connexe de centre connexe et de dual de centre connexe). La bonne représentation  $\Pi(\rho)$  de  $\text{GL}_n(\mathbb{Q}_p)$  associée à  $\rho$  par une hypothétique correspondance locale modulo  $p$  (resp.  $p$ -adique) n'est pas connue si  $n > 2$ , mais  $\Pi(\rho)^{\text{ord}}$  devrait être sa plus grande sous-représentation formée de séries principales. On sait par exemple dans de nombreux cas que  $\Pi(\rho)^{\text{ord}}$  apparaît dans des espaces de formes automorphes modulo  $p$  (resp.  $p$ -adiques), cf. [Breuil et Herzig 2015, §4] ou [Bergdall et Chojacki 2014]. Un point fondamental est que la construction de  $\Pi(\rho)^{\text{ord}}$  semble fonctoriellement reliée plutôt à une sous-représentation explicite de la représentation galoisienne  $\otimes_{i=1}^{n-1} \wedge^i \rho$  qu'à la représentation  $\rho$  elle-même (si  $n > 2$ ). Une question ouverte posée dans [Breuil et Herzig 2015, §3.5] est de savoir s'il existe un foncteur exact généralisant le foncteur défini par Colmez pour  $\text{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$  et qui envoie  $\Pi(\rho)^{\text{ord}}$  sur le  $(\varphi, \Gamma)$ -module de cette sous-représentation (à torsion près par un caractère). Il n'est pas clair que le  $\delta$ -foncteur de Schneider–Vignéras, au moins tel que, satisfasse cette condition.

Dans le présent article, on propose une nouvelle généralisation du foncteur de Colmez, dont la définition est relativement simple et naturelle, et qui envoie bien  $\Pi(\rho)^{\text{ord}}$  sur le  $(\varphi, \Gamma)$ -module de la sous-représentation voulue de  $\otimes_{i=1}^{n-1} \wedge^i \rho$  (à twist près). En général ce foncteur est à valeurs dans les pro- $(\varphi, \Gamma)$ -modules étales de Fontaine. Ses relations avec le  $\delta$ -foncteur de Schneider–Vignéras ont commencé à être étudiées par Erdélyi et Zábrádi [2014].

Expliquons brièvement la définition du foncteur de cet article, qui combine des idées de Colmez [2010], Emerton [2008; 2010], Schneider–Vignéras [2011] et Schraen [2012–14; 2015]. Soit  $N$  le radical unipotent de  $B$ , on choisit d'abord un sous-groupe ouvert compact  $N_0$  de  $N(L)$  totalement décomposé (cf. § 3), un morphisme de groupes algébriques  $\ell : N \rightarrow \mathbb{G}_a$  qui se factorise par  $\prod_{\alpha \in S} N_\alpha$  et qui est non nul sur chaque facteur  $N_\alpha$  (où  $S$  désigne les racines simples de  $(G, B, T)$  et  $N_\alpha \subseteq N$  le sous-groupe radiciel de la racine  $\alpha$ ) et des cocaractères fondamentaux  $(\lambda_{\alpha^\vee})_{\alpha \in S} \in X^\vee(T)^S$  (qui existent car  $G$  est de centre connexe).

Soit  $N_1 = \text{Ker}(N_0 \xrightarrow{\ell} L \xrightarrow{\text{Tr}_{L/\mathbb{Q}_p}} \mathbb{Q}_p)$  et  $\xi = \sum_{\alpha \in S} \lambda_{\alpha^\vee} \in X^\vee(T)$ . Si  $\pi$  est une représentation lisse de  $B(L)$  sur un  $\mathcal{O}_E/(\varpi_E^m)$ -module, alors  $\pi^{N_1}$  est naturellement muni d’une structure de  $\mathcal{O}_E/(\varpi_E^m)[[X]]$ -module, d’une action lisse de  $\mathbb{Z}_p^\times$  via l’action de  $\xi(\mathbb{Z}_p^\times)$  sur  $\pi$  (qui préserve  $\pi^{N_1}$ ) et d’un endomorphisme  $\mathcal{O}_E/(\varpi_E^m)[[X]]$ -semi-linéaire  $F$  donné par l’action de Hecke de  $\xi(p)$  sur  $\pi^{N_1}$  à la manière de [Emerton 2010] (mais avec  $N_1$  au lieu de  $N_0$ ). Si  $M \subseteq \pi^{N_1}$  est un sous- $\mathcal{O}_E/(\varpi_E^m)[[X]][F]$ -module de type fini qui est admissible comme  $\mathcal{O}_E/(\varpi_E^m)[[X]]$ -module (i.e., tel que  $\{m \in M, Xm = 0\}$  est un  $\mathcal{O}_E/(\varpi_E^m)$ -module de type fini) et stable par  $\mathbb{Z}_p^\times$ , alors la même preuve que dans [Colmez 2010] montre que  $M^\vee[1/X] = \text{Hom}_{\mathcal{O}_E/(\varpi_E^m)}(M, \mathcal{O}_E/(\varpi_E^m)[1/X])$  est naturellement muni d’une structure de  $(\varphi, \Gamma)$ -module étale sur  $\mathcal{O}_E/(\varpi_E^m)$ . On définit alors (voir §3) :

$$D_\xi^\vee(\pi) \stackrel{\text{déf}}{=} \varprojlim_M (\text{Hom}_{\mathcal{O}_E/(\varpi_E^m)}(M, \mathcal{O}_E/(\varpi_E^m)[1/X])$$

la limite projective étant prise sur les sous- $\mathcal{O}_E/(\varpi_E^m)[[X]][F]$ -modules de type fini  $M$  de  $\pi^{N_1}$  admissibles comme  $\mathcal{O}_E/(\varpi_E^m)[[X]]$ -modules et stables par  $\mathbb{Z}_p^\times$ .

On peut aussi définir  $D_\xi^\vee(\pi)$  comme la limite projective des  $\mathcal{O}_E/(\varpi_E^m)[[X]][1/X]$ -modules quotients de  $\text{Hom}_{\mathcal{O}_E/(\varpi_E^m)}(\pi^{N_1}, \mathcal{O}_E/(\varpi_E^m)[1/X])$  qui sont des  $(\varphi, \Gamma)$ -modules étales, voir le (iii) de la remarque 5.6.

Cette définition, assez simple et directe, a quelques inconvénients, par exemple j’ignore en général quand  $D_\xi^\vee(\pi)$  est non nul ou quand c’est un “vrai”  $(\varphi, \Gamma)$ -module (étale). Par ailleurs, contrairement au cas de  $\text{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$ , il est impossible en général de retrouver  $\pi$  à partir de  $D_\xi^\vee(\pi)$ , comme le montre déjà le cas des séries principales (cf. Exemple 7.6). Mais elle a aussi des avantages car elle permet de montrer les résultats suivants :

- (i)  $D_\xi^\vee$  transforme une suite exacte  $0 \rightarrow \pi' \rightarrow \pi \rightarrow \pi''$  de représentations lisses de  $B(L)$  en une suite exacte  $D_\xi^\vee(\pi'') \rightarrow D_\xi^\vee(\pi) \rightarrow D_\xi^\vee(\pi') \rightarrow 0$  (i.e.,  $D_\xi^\vee$  est contravariant exact à droite), cf. proposition 3.2 ;
- (ii)  $D_\xi^\vee$  est insensible aux inductions paraboliques, i.e.,  $D_\xi^\vee(\text{Ind}_{P^-(L)}^{G(L)} \pi_P) \cong D_\xi^\vee(\pi_P)$  où  $P$  est un parabolique de  $G$  contenant  $B$ ,  $P^-$  le parabolique opposé et  $\pi_P$  une représentation lisse du Levi  $L_P(L)$ , cf. Théorème 6.1 ;
- (iii)  $D_\xi^\vee$  est exact et donne de “vrais”  $(\varphi, \Gamma)$ -modules étales lorsque restreint à la catégorie abélienne des représentations de longueur finie de  $G(L)$  dont les constituants sont des sous-quotients de séries principales, cf. corollaire 9.3.

(Et bien sûr  $D_\xi^\vee$  ne dépend à isomorphisme près que de  $\xi$ , cf. §4, et coïncide à normalisation près avec le foncteur défini par Colmez [2010] lorsque  $G(L) = \text{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$ , cf. proposition 3.2). Par un passage à la limite projective, la propriété (iii) permet d’étendre facilement  $D_\xi^\vee$  à la catégorie abélienne des représentations continues unitaires topologiquement de longueur finie de  $G(L)$  sur  $E$  dont les

constituants sont des sous-quotients de séries principales continues unitaires, cf. §9. Une motivation à l’origine de la définition de  $D_\xi^\vee$  ci-dessus est de se débarrasser des constructions par “intersection” dont le comportement par suite exacte courte semble en général problématique, cf. par exemple [Schneider et Vignéras 2011, §2]. Une deuxième motivation provient des calculs de Schraen et Morra ([Morra et Schraen  $\geq$  2015; Schraen 2012–14], cf. la remarque 3.3). Une troisième motivation est la propriété (ii) ci-dessus, suggérée par les constructions de [Breuil et Herzig 2015]. En fait, les propriétés (ii) et (iii), combinées avec une compatibilité de  $D_\xi^\vee$  au produit tensoriel (dont la preuve occupe le §5, cf. proposition 5.5) et un passage à la limite projective, permettent de répondre à une question importante de [Breuil et Herzig 2015, §3.5] qui avait motivé les constructions de [loc. cit.] (on renvoie au §9 pour plus de détails et pour un énoncé totalement précis) :

**Théorème 1.1** (cf. corollaire 9.8). *Supposons que  $L = \mathbb{Q}_p$  et que le dual  $\widehat{G}$  de  $G$  a un centre connexe. Soit :*

$$\rho : \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p) \rightarrow \widehat{B}(E)$$

*une représentation continue générique au sens de [Breuil et Herzig 2015, §3.3] où  $\widehat{B}$  est le Borel dual de  $B$  et soit  $\Pi(\rho)^{\text{ord}}$  la représentation de  $G(\mathbb{Q}_p)$  associée à  $\rho$  construite dans [loc. cit.] (extension successive convenable de séries principales continues unitaires). Alors à torsion près on a un isomorphisme de  $(\varphi, \Gamma)$ -modules étales sur  $E$  :*

$$D_\xi^\vee(\Pi(\rho)^{\text{ord}}) \cong (\varphi, \Gamma)\text{-module du dual de } ((L^\otimes|_{\widehat{B}_{C_\rho}})^{\text{ord}} \circ \rho)$$

*où  $L^\otimes$  est le produit tensoriel des représentations algébriques fondamentales de  $G$  sur  $E$ ,  $\widehat{B}_{C_\rho}$  le plus petit sous-groupe fermé de  $\widehat{B}$  contenant l’image de  $\rho$  et  $(L^\otimes|_{\widehat{B}_{C_\rho}})^{\text{ord}}$  la “partie ordinaire” de  $L^\otimes|_{\widehat{B}_{C_\rho}}$  (cf. [Breuil et Herzig 2015, §2.3]).*

La même preuve (en plus simple) donne également une version en caractéristique  $p$  de ce théorème.

Bien entendu, on ne peut guère espérer faire de progrès substantiels sur  $D_\xi^\vee$  sans avancer dans la compréhension des supersingulières de  $G(L)$  sur  $\mathcal{O}_E/(\varpi_E)$  lorsque  $G(L) \neq \text{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$ , comme le montre par exemple la propriété (ii) précédente combinée avec le résultat principal de [Abe 2013; Herzig 2011] (cf. aussi la remarque 8.7 et [Morra et Schraen  $\geq$  2015]). On peut par contre poser plusieurs questions naturelles sur le foncteur  $D_\xi^\vee$ , voir la remarque 3.3 pour deux d’entre elles. Je mentionnerai ici juste le sentiment suivant : l’exactitude de  $D_\xi^\vee$  en restriction à la sous-catégorie des représentations de  $G(L)$  dont les constituants sont des sous-quotients de séries principales (propriété (iii) ci-dessus, cf. aussi corollaire 9.2) suggère que cela pourrait être vrai plus généralement.

Voici les principales notations de l'article. Dans tout le texte,  $L$  (le corps de base) et  $E$  (le corps des coefficients) sont deux extensions finies quelconques de  $\mathbb{Q}_p$ . On note  $\mathcal{O}_L, \mathcal{O}_E$  leurs anneaux d'entiers respectifs,  $\varpi_E \in \mathcal{O}_E$  une uniformisante de  $\mathcal{O}_E$  et  $k_E = \mathcal{O}_E/(\varpi_E)$  son corps résiduel. On normalise l'application de réciprocity de la théorie du corps de classes local de sorte que les Frobenius géométriques s'envoient sur les uniformisantes. On désigne par  $\varepsilon$  le caractère cyclotomique  $p$ -adique.

Si  $A = \mathcal{O}_E/(\varpi_E^m)$  (pour un entier  $m \geq 1$ ) et  $H$  est un groupe analytique  $p$ -adique compact, on note  $A[[H]]$  l'algèbre d'Iwasawa de  $H$  à coefficients dans  $A$ . Si  $M$  est un  $A$ -module, on note  $M^\vee \stackrel{\text{déf}}{=} \text{Hom}_A(M, A)$  le dual algébrique. Si  $\pi$  est une représentation lisse d'un groupe analytique  $p$ -adique sur un  $A$ -module, on commet souvent (toujours) l'abus de notation d'identifier  $\pi$  et son  $A$ -module sous-jacent.

On munit  $A[[X]][1/X]$  d'une action  $A$ -linéaire de  $\mathbb{Z}_p^\times$  par  $a(S(X)) \stackrel{\text{déf}}{=} S((1+X)^a - 1)$  et d'un endomorphisme de Frobenius  $A$ -linéaire  $\varphi$  par  $\varphi(S(X)) \stackrel{\text{déf}}{=} S((1+X)^p - 1)$  qui commute à  $\mathbb{Z}_p^\times$  ( $a \in \mathbb{Z}_p^\times, S(X) \in A[[X]][1/X]$ ). Ces actions respectent le sous-anneau  $A[[X]]$ . On appelle  $(\varphi, \Gamma)$ -module de longueur finie un  $A[[X]][1/X]$ -module de longueur finie  $D$  muni d'un endomorphisme  $\varphi : D \rightarrow D$  tel que  $\varphi(S(X)v) = \varphi(S(X))\varphi(v)$  et d'une action continue de  $\Gamma \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_p^\times$  (pour la topologie  $X$ -adique sur  $D$ ) commutant à  $\varphi$  telle que  $a(S(X)v) = a(S(X))a(v)$  ( $S(X) \in A[[X]][1/X], v \in D, a \in \mathbb{Z}_p^\times$ ). On dit qu'un  $(\varphi, \Gamma)$ -module de longueur finie  $D$  est étale si l'image de  $\varphi$  engendre  $D$  comme  $A[[X]][1/X]$ -module, ou de manière équivalente si l'on a un isomorphisme  $\text{Id} \otimes \varphi : A[[X]][1/X] \otimes_{\varphi, A[[X]][1/X]} D \xrightarrow{\sim} D$ . La catégorie des  $(\varphi, \Gamma)$ -modules de longueur finie étales est abélienne et équivalente à la catégorie des représentations continues de  $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p)$  sur un  $A$ -module de longueur finie [Fontaine 1990]. On la note  $\Phi\Gamma_A^{\text{ét}}$ .

## 2. Les $A[[X]][F]$ -modules de torsion sur $A[[X]]$

On donne quelques définitions et résultats préliminaires sur les  $A[[X]][F]$ -modules qui sont de torsion sur  $A[[X]]$ .

On fixe un entier  $m \geq 1$  et on pose  $A \stackrel{\text{déf}}{=} \mathcal{O}_E/(\varpi_E^m)$ . On note  $A[[X]][F]$  l'algèbre non commutative des polynômes en  $F$  à coefficients dans les séries formelles  $A[[X]]$  avec  $FX = ((1+X)^p - 1)F$ . Rappelons qu'un  $A[[X]]$ -module  $M$  est de torsion si tout sous- $A[[X]]$ -module de type fini est de type fini sur  $A$  et qu'un  $A[[X]]$ -module de torsion est admissible si  $M[X] \stackrel{\text{déf}}{=} \{m \in M, Xm = 0\}$  est de type fini sur  $A$  (de manière équivalente  $M[X^n] \stackrel{\text{déf}}{=} \{m \in M, X^n m = 0\}$  est de type fini sur  $A$  pour tout entier  $n > 0$ ). De même un  $A[F]$ -module est de torsion si tout sous- $A[F]$ -module de type fini est de type fini sur  $A$ . Nous ne considérons dans cet article que des  $A[[X]][F]$ -modules  $M$  qui sont de torsion comme  $A[[X]]$ -modules (que l'on appelle  $A[[X]][F]$ -modules de torsion sur  $A[[X]]$ ), et parmi eux ceux vérifiant en particulier

les conditions :

$$\begin{cases} M \text{ est de type fini comme } A[[X]][F]\text{-module} \\ M \text{ est admissible comme } A[[X]]\text{-module.} \end{cases} \quad (1)$$

Rappelons que,  $A[[X]][F]$  n'étant pas noethérien, un sous- $A[[X]][F]$ -module d'un  $A[[X]][F]$ -module de type fini n'est pas de type fini en général.

**Lemme 2.1.** (i) *Si  $M$  est un  $A[[X]][F]$ -module de torsion sur  $A[[X]]$  vérifiant les conditions (1), alors tout  $A[[X]][F]$ -module sous-quotient de  $M$  vérifie (1).*

(ii) *Si  $N$  est un  $A[[X]][F]$ -module de torsion sur  $A[[X]]$  et  $M, M' \subseteq N$  sont deux sous- $A[[X]][F]$ -modules vérifiant (1), alors  $M + M'$  vérifie aussi (1).*

*Démonstration.* Le (ii) découle du (i) et du fait que  $M \oplus M'$  vérifie (1). Le (i) découle de [Emerton 2008, Proposition 3.3] après un dévissage pour se ramener à  $A = k_E$ . □

**Définition 2.2.** On dit qu'un  $A[[X]][F]$ -module de torsion sur  $A[[X]]$  satisfait la propriété Ad (pour Admissible) si tout sous- $A[[X]][F]$ -module de type fini est admissible comme  $A[[X]]$ -module.

**Lemme 2.3.** *Soit  $N$  un  $A[[X]][F]$ -module de torsion sur  $A[[X]]$  qui satisfait la propriété Ad.*

(i) *Tout  $A[[X]][F]$ -module sous-quotient de  $N$  satisfait la propriété Ad.*

(ii) *Le  $A[F]$ -module  $N/XN$  est de torsion.*

*Démonstration.* (i) C'est clair pour un sous- $A[[X]][F]$ -module. Pour un  $A[[X]][F]$ -module quotient  $\bar{N}$  de  $N$ , il suffit de relever dans  $N$  des générateurs d'un sous- $A[[X]][F]$ -module de type fini de  $\bar{N}$  et d'appliquer le (i) du lemme 2.1. Un sous-quotient étant un quotient d'un sous-objet, cela montre (i).

(ii) Soit  $v \in N/XN$ , il faut montrer que le sous- $A[F]$ -module  $A[F]v$  de  $N/XN$  engendré par  $v$  est de type fini sur  $A$ . Par un dévissage facile (notons que tout sous- $A[F]$ -module de  $A[F]v$  est de type fini sur  $A[F]$ ), on peut supposer  $A = k_E$ . Soit  $\hat{v} \in N$  qui relève  $v$ , alors le  $k_E[[X]][F]$ -sous-module  $k_E[[X]][F]\hat{v}$  de  $N$  engendré par  $\hat{v}$  est admissible comme  $k_E[[X]]$ -module par hypothèse. Par [Emerton 2008, Proposition 3.5], le  $k_E[F]$ -module  $k_E[[X]][F]\hat{v}/Xk_E[[X]][F]\hat{v}$  est de torsion. Comme on a une surjection  $k_E[F]$ -linéaire  $k_E[[X]][F]\hat{v}/Xk_E[[X]][F]\hat{v} \rightarrow k_E[F]v$ , il en est de même du  $k_E[F]$ -module  $k_E[F]v$ . □

Notons qu'un  $A[[X]][F]$ -module de torsion sur  $A[[X]]$  qui est aussi de torsion sur  $A[F]$  satisfait en particulier la propriété Ad (puisque tout sous- $A[[X]][F]$ -module de type fini est dans ce cas de type fini sur  $A$ ).

**Lemme 2.4.** *Soit  $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M''$  une suite exacte de  $A[[X]][F]$ -modules de torsion sur  $A[[X]]$  tels que  $M$  est de type fini sur  $A[[X]][F]$  et  $M''$  est admissible*

comme  $A[[X]]$ -module. Supposons que  $M'$  satisfait la propriété Ad, alors  $M'$  est un  $A[[X]]$ -module admissible et un  $A[[X]][F]$ -module de type fini, et  $M$  est un  $A[[X]]$ -module admissible.

*Démonstration.* Par le (i) du [lemme 2.1](#) il suffit de montrer que  $M$  est un  $A[[X]]$ -module admissible. Quitte à remplacer  $M''$  par l'image de  $M$  (encore le (i) du [lemme 2.1](#)), on peut supposer que la suite est exacte à droite. Par un dévissage facile (utilisant le (i) du [lemme 2.3](#)) on se ramène au cas  $A = k_E$ . On a une suite exacte courte de  $k_E[F]$ -modules :

$$0 \rightarrow M'/(M' \cap XM) \rightarrow M/XM \rightarrow M''/XM'' \rightarrow 0.$$

Comme  $M'/XM'$  est un  $k_E[F]$ -module de torsion par le (ii) du [lemme 2.3](#), il en est de même du quotient  $M'/(M' \cap XM)$ . Comme  $M''$  est un  $k_E[[X]]$ -module admissible, le  $k_E[F]$ -module  $M''/XM''$  est de torsion par [[Emerton 2008](#), Proposition 3.5]. On déduit alors de la suite exacte courte ci-dessus que  $M/XM$  est aussi un  $k_E[F]$ -module de torsion, et donc par [[Emerton 2008](#), Proposition 3.5] que  $M$  est un  $k_E[[X]]$ -module admissible.  $\square$

**Lemme 2.5.** Soit  $N' \rightarrow N \rightarrow N''$  une suite exacte de  $A[[X]][F]$ -modules de torsion sur  $A[[X]]$ .

- (i) Si  $N'$  et  $N''$  sont de torsion sur  $A[F]$ , alors il en est de même de  $N$ .
- (ii) Si  $N'$  et  $N''$  satisfont la propriété Ad, alors il en est de même de  $N$ .

*Démonstration.* (i) est clair.

(ii) Par le (i) du [lemme 2.3](#), on peut remplacer  $N'$  par son image dans  $N$  et donc supposer la suite exacte à gauche. Soit  $M \subseteq N$  un sous  $A[[X]][F]$ -module de type fini,  $M''$  son image dans  $N''$ , qui est un  $A[[X]]$ -module admissible car  $N''$  satisfait Ad, et  $M' \stackrel{\text{déf}}{=} M \cap N'$ , qui satisfait Ad par le (i) du [lemme 2.3](#). Alors la suite exacte  $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M''$  vérifie les hypothèses du [lemme 2.4](#) et donc  $M$  est un  $A[[X]]$ -module admissible.  $\square$

Soit  $N$  un  $A[[X]][F]$ -module de torsion sur  $A[[X]]$  muni d'une action  $A$ -linéaire lisse de  $\mathbb{Z}_p^\times$  vérifiant ( $a \in \mathbb{Z}_p^\times$ ,  $S(X) \in A[[X]]$ ,  $n \geq 0$ ,  $v \in N$ ) :

$$a(S(X)F^n(v)) = S((1+X)^a - 1)F^n(a(v)). \quad (2)$$

On note  $\mathcal{M}(N)$  l'ensemble des sous- $A[[X]][F]$ -modules de  $N$  stables par  $\mathbb{Z}_p^\times$  et vérifiant (1).

**Lemme 2.6.** Si  $M \in \mathcal{M}(N)$  alors  $M^\vee[1/X] = \text{Hom}_A(M, A)[1/X]$  est naturellement muni d'une structure d'objet de  $\Phi\Gamma_A^{\text{ét}}$ .

*Démonstration.* Cette preuve est déjà dans [[Colmez 2010](#)] ou [[Emerton 2008](#)]. On munit  $M^\vee$  d'une structure de  $A[[X]]$ -module (à gauche) par  $(S(X)f)(m) \stackrel{\text{déf}}{=} m \cdot S(X)$ .

$f(S(X)m)$ , d'une action de  $\mathbb{Z}_p^\times$  par  $(x(f))(m) \stackrel{\text{d\u00e9f}}{=} f(x^{-1}(m))$  et d'un endomorphisme  $F$  par  $F(f)(m) \stackrel{\text{d\u00e9f}}{=} f(F(m))$  o\u00f9  $S(X) \in A[[X]]$ ,  $x \in \mathbb{Z}_p^\times$ ,  $f \in M^\vee$  et  $m \in M$ . Noter que  $M^\vee$  est un  $A[[X]]$ -module de type fini puisque  $M$  est admissible comme  $A[[X]]$ -module. Il faut munir  $M^\vee[1/X]$  d'un Frobenius semi-l\u00e9naire  $\varphi$ . Soit  $C$  le conoyau de  $A[[X]] \otimes_{\varphi, A[[X]]} M \xrightarrow{\text{Id} \otimes F} M$ , c'est un  $A[[X]]$ -module de type fini (car  $M$  est un  $A[[X]][[F]]$ -module de type fini) et de torsion, donc de longueur finie. On a donc  $C^\vee[1/X] = 0$  d'o\u00f9 on d\u00e9duit une injection  $A[[X]][1/X]$ -lin\u00e9aire, donc un isomorphisme, entre  $A[[X]][1/X]$ -modules de (m\u00eame) longueur finie :

$$M^\vee[1/X] \xrightarrow{\sim} (A[[X]] \otimes_{\varphi, A[[X]]} M)^\vee[1/X] \cong A[[X]] \otimes_{\varphi, A[[X]]} M^\vee[1/X] \quad (3)$$

dont l'inverse est par d\u00e9finition l'application  $\text{Id} \otimes \varphi$  (le deuxi\u00e8me isomorphisme provient de l'isomorphisme  $A[[X]]$ -lin\u00e9aire  $(A[[X]] \otimes_{\varphi, A[[X]]} M)^\vee \cong A[[X]] \otimes_{\varphi, A[[X]]} M^\vee$  donn\u00e9 par  $f \mapsto \sum_{i=0}^{p-1} (1+X)^{p-1-i} \otimes f_i$  o\u00f9  $f_i \in M^\vee$  est d\u00e9fini par  $f_i(v) \stackrel{\text{d\u00e9f}}{=} f((1+X)^i \otimes v)$  pour  $v \in M$ ). On laisse le lecteur v\u00e9rifier que le  $A[[X]][1/X]$ -module  $M^\vee[1/X]$  muni de l'action induite de  $\mathbb{Z}_p^\times$  et de  $\varphi$  est bien un  $(\varphi, \Gamma)$ -module, n\u00e9cessairement \u00e9tale par (3). □

Rappelons que  $A[[X]][1/X]$  est un anneau artinien, donc pseudo-compact lorsqu'on le munit de la topologie discr\u00e8te, et qu'un  $A[[X]][1/X]$ -module pseudo-compact est un  $A[[X]][1/X]$ -module topologique isomorphe \u00e0 une limite projective  $\varprojlim_{i \in I} D_i$  de  $A[[X]][1/X]$ -modules  $D_i$  de longueur finie (ou de mani\u00e8re \u00e9quivalente de type fini) avec la topologie de la limite projective (et la topologie discr\u00e8te sur chaque  $D_i$ ) pour un ensemble d'indices  $I$  pr\u00e9ordonn\u00e9 filtrant quelconque. En prenant comme morphismes les applications  $A[[X]][1/X]$ -lin\u00e9aires continues, on obtient une cat\u00e9gorie ab\u00e9lienne (voir, e.g., [Gabriel 1962, \u00a7IV.3]).

Appelons  $(\varphi, \Gamma)$ -module pseudo-compact \u00e9tale tout  $A[[X]][1/X]$ -module topologique  $D$  muni d'actions de  $\mathbb{Z}_p^\times$  et  $\varphi$  tel que  $D$  est topologiquement isomorphe \u00e0 une limite projective  $\varprojlim_{i \in I} D_i$  comme ci-dessus o\u00f9 les  $D_i \rightarrow D_j$  sont des morphismes dans la cat\u00e9gorie  $\widehat{\Phi}\Gamma_A^{\text{\u00e9t}}$  et o\u00f9 l'isomorphisme est compatible aux actions de  $\mathbb{Z}_p^\times$  et  $\varphi$  (les actions sur  $\varprojlim D_i$  \u00e9tant induites par celles sur chaque  $D_i$ ). Le  $A[[X]][1/X]$ -module sous-jacent \u00e0 un  $(\varphi, \Gamma)$ -module pseudo-compact \u00e9tale est donc en particulier pseudo-compact. En prenant comme morphismes les applications  $A[[X]][1/X]$ -lin\u00e9aires continues qui commutent \u00e0  $\mathbb{Z}_p^\times$  et  $\varphi$ , on obtient une cat\u00e9gorie ab\u00e9lienne  $\widehat{\Phi}\Gamma_A^{\text{\u00e9t}}$  avec limites projectives exactes (la preuve est comme celle de [Gabriel 1962, \u00a7IV.3, th\u00e9or\u00e8me 3]).

Notons  $\text{Mod}_A$  la cat\u00e9gorie des  $A[[X]][[F]]$ -modules de torsion sur  $A[[X]]$  qui sont munis d'une action  $A$ -lin\u00e9aire lisse de  $\mathbb{Z}_p^\times$  comme en (2) (les fl\u00e8ches \u00e9tant les applications  $A[[X]][[F]]$ -lin\u00e9aires commutant \u00e0  $\mathbb{Z}_p^\times$ ). C'est une cat\u00e9gorie ab\u00e9lienne

de manière évidente. Si  $N$  est un objet de  $\text{Mod}_A$ , on pose :

$$D^\vee(N) \stackrel{\text{déf}}{=} \varprojlim_{M \in \mathcal{M}(N)} (M^\vee[1/X]). \quad (4)$$

En particulier  $D^\vee(M) = M^\vee[1/X] \in \widehat{\Phi}\Gamma_A^{\text{ét}}$  si  $M$  est un objet de  $\text{Mod}_A$  dont le  $A[[X]][F]$ -module sous-jacent vérifie (1). La proposition suivante rassemble les propriétés de  $D^\vee$ .

**Proposition 2.7.** (i) *Pour tout  $N$  dans  $\text{Mod}_A$ ,  $D^\vee(N)$  est un objet de  $\widehat{\Phi}\Gamma_A^{\text{ét}}$  et  $N \mapsto D^\vee(N)$  induit un foncteur contravariant de la catégorie  $\text{Mod}_A$  vers la catégorie  $\widehat{\Phi}\Gamma_A^{\text{ét}}$ .*

(ii) *Si  $0 \rightarrow N' \rightarrow N \rightarrow N''$  est une suite exacte dans  $\text{Mod}_A$  alors  $D^\vee(N'') \rightarrow D^\vee(N) \rightarrow D^\vee(N') \rightarrow 0$  est une suite exacte dans  $\widehat{\Phi}\Gamma_A^{\text{ét}}$ .*

(iii) *Si  $N$  est un objet de  $\text{Mod}_A$  de torsion comme  $A[F]$ -module, alors  $D^\vee(N) = 0$ .*

(iv) *Si  $0 \rightarrow N' \rightarrow N \rightarrow N'' \rightarrow N'''$  est une suite exacte dans  $\text{Mod}_A$ , si le  $A[[X]][F]$ -module  $N'$  satisfait la propriété Ad et si  $N'''$  est de torsion sur  $A[F]$ , alors  $0 \rightarrow D^\vee(N'') \rightarrow D^\vee(N) \rightarrow D^\vee(N') \rightarrow 0$  est une suite exacte dans  $\widehat{\Phi}\Gamma_A^{\text{ét}}$ .*

*Démonstration.* (i) La première assertion du (i) découle du (ii) du [lemme 2.1](#), qui montre que l'ensemble  $\mathcal{M}(N)$  préordonné par l'inclusion est filtrant, et du [lemme 2.6](#). Un morphisme  $f : N' \rightarrow N$  dans  $\text{Mod}_A$  induit une application  $\mathcal{M}(N') \rightarrow \mathcal{M}(N)$ ,  $M' \mapsto f(M')$  par le (i) du [lemme 2.1](#). En particulier on a une inclusion  $\{f(M'), M' \in \mathcal{M}(N')\} \subseteq \mathcal{M}(N)$ . De plus le morphisme  $M' \rightarrow f(M')$  dans  $\text{Mod}_A$  induit par functorialité de  $(\cdot)^\vee[1/X]$  un morphisme  $D^\vee(f(M')) \rightarrow D^\vee(M')$  dans  $\widehat{\Phi}\Gamma_A^{\text{ét}}$ . On en déduit des morphismes dans  $\widehat{\Phi}\Gamma_A^{\text{ét}}$  dont le premier est surjectif :

$$\varprojlim_{M \in \mathcal{M}(N)} D^\vee(M) \longrightarrow \varprojlim_{M' \in \mathcal{M}(N')} D^\vee(f(M')) \longrightarrow \varprojlim_{M' \in \mathcal{M}(N')} D^\vee(M') \quad (5)$$

d'où la functorialité de  $D^\vee$ .

(ii) En remplaçant  $N''$  par l'image de  $N$ , il suffit de traiter le cas où l'application  $N \rightarrow N''$  est surjective. Si  $M \in \mathcal{M}(N)$ , on a  $M \cap N' \in \mathcal{M}(N')$  par le (i) du [lemme 2.1](#) et tous les éléments de  $\mathcal{M}(N')$  sont de cette forme (car  $\mathcal{M}(N') \subseteq \mathcal{M}(N)$ ). On en déduit :

$$D^\vee(N') \cong \varprojlim_{M \in \mathcal{M}(N)} D^\vee(M \cap N'). \quad (6)$$

Soit  $f$  la surjection  $N \twoheadrightarrow N''$ , pour tout  $M \in \mathcal{M}(N)$  on a en particulier une suite exacte dans  $\text{Mod}_A$  :

$$0 \rightarrow M \cap N' \rightarrow M \rightarrow f(M) \rightarrow 0$$

d'où on déduit une suite exacte dans  $\widehat{\Phi}\Gamma_A^{\text{ét}}$  :

$$0 \rightarrow D^\vee(f(M)) \rightarrow D^\vee(M) \rightarrow D^\vee(M \cap N') \rightarrow 0.$$

puisque dans ce cas  $D^\vee(\cdot) = \text{Hom}_A(\cdot, A)[1/X]$  est un foncteur exact (rappelons que  $A = \mathcal{O}_E/(\varpi_E^m)$ ). Par exactitude des limites projectives dans  $\widehat{\Phi}\Gamma_A^{\text{ét}}$ , on obtient encore une suite exacte dans  $\widehat{\Phi}\Gamma_A^{\text{ét}}$  :

$$0 \rightarrow \varprojlim_{M \in \mathcal{M}(N)} D^\vee(f(M)) \longrightarrow \varprojlim_{M \in \mathcal{M}(N)} D^\vee(M) \longrightarrow \varprojlim_{M \in \mathcal{M}(N)} D^\vee(M \cap N') \rightarrow 0$$

d'où on déduit une suite exacte  $D^\vee(N'') \rightarrow D^\vee(N) \rightarrow D^\vee(N') \rightarrow 0$  dans  $\widehat{\Phi}\Gamma_A^{\text{ét}}$  par (6) et la surjectivité de la première flèche en (5) appliquée à  $f : N \rightarrow N''$ .

(iii) Tout  $M$  dans  $\mathcal{M}(N)$  est alors un  $A$ -module de type fini, d'où  $M^\vee[1/X] = 0$  et donc  $D^\vee(N) = \varprojlim D^\vee(M) = 0$ .

(iv) Soit  $f$  le morphisme  $N \rightarrow N''$ , on a deux suites exactes  $0 \rightarrow N' \rightarrow N \rightarrow f(N) \rightarrow 0$  et  $0 \rightarrow f(N) \rightarrow N'' \rightarrow N''' \rightarrow 0$  dans  $\text{Mod}_A$ . Par (ii) appliqué à  $0 \rightarrow f(N) \rightarrow N'' \rightarrow N'''$  et (iii), on en déduit un isomorphisme  $D^\vee(N'') \xrightarrow{\sim} D^\vee(f(N))$  dans  $\widehat{\Phi}\Gamma_A^{\text{ét}}$ . Il suffit donc de montrer l'énoncé (iv) en supposant  $N''' = 0$ , i.e., en supposant  $f$  surjectif. En procédant comme dans la preuve du (ii), on a une injection :

$$\varprojlim_{M \in \mathcal{M}(N)} D^\vee(f(M)) \hookrightarrow \varprojlim_{M \in \mathcal{M}(N)} D^\vee(M) = D^\vee(N). \tag{7}$$

Soit  $M \in \mathcal{M}(N'')$  et  $\widehat{M} \subseteq N$  un sous- $A[[X]][F]$ -module de type fini stable par  $\mathbb{Z}_p^\times$  relevant  $M$  (il en existe car  $f$  est surjectif,  $M$  est de type fini sur  $A[[X]][F]$  et l'action de  $\mathbb{Z}_p^\times$  est lisse). On a une suite exacte  $0 \rightarrow \widehat{M} \cap N' \rightarrow \widehat{M} \rightarrow M \rightarrow 0$  où  $M$  est admissible comme  $A[[X]]$ -module (par définition) et où  $\widehat{M} \cap N'$  satisfait Ad (car  $N'$  satisfait Ad). Par le lemme 2.4,  $\widehat{M}$  est admissible comme  $A[[X]]$ -module, donc est dans  $\mathcal{M}(N)$ . Ainsi l'application  $\mathcal{M}(N) \rightarrow \mathcal{M}(N'')$  induite par  $f$  est surjective ce qui implique  $\{f(M), M \in \mathcal{M}(N)\} = \mathcal{M}(N'')$  et donc un isomorphisme dans  $\widehat{\Phi}\Gamma_A^{\text{ét}}$  :

$$D^\vee(N'') = \varprojlim_{M \in \mathcal{M}(N'')} D^\vee(M) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{M \in \mathcal{M}(N)} D^\vee(f(M)). \tag{8}$$

En combinant (7) et (8), on voit que la flèche  $D^\vee(N'') \rightarrow D^\vee(N)$  est injective, ce qui par (ii) achève la preuve. □

Si  $N' \rightarrow N \rightarrow N'' \rightarrow N'''$  est une suite exacte dans  $\text{Mod}_A$  et si  $N'$  et  $N'''$  sont de torsion sur  $A[F]$ , on déduit aussi du (iii) et du (iv) de la proposition 2.7 un isomorphisme  $D^\vee(N'') \xrightarrow{\sim} D^\vee(N)$  dans  $\widehat{\Phi}\Gamma_A^{\text{ét}}$ .

### 3. Un foncteur vers les (pro-) $(\varphi, \Gamma)$ -modules

On définit un foncteur contravariant de la catégorie des représentations lisses du Borel vers la catégorie  $\widehat{\Phi}\Gamma_A^{\text{ét}}$ .

On conserve les notations du § 2. On fixe pour toute la suite  $(G, B, T)$  où  $G$  est un groupe algébrique réductif connexe déployé sur  $L$ ,  $B \subset G$  est un sous-groupe de Borel (défini sur  $L$ ) et  $T \subset B$  un tore maximal (déployé sur  $L$ ). On note  $N$  le radical unipotent de  $B$ . On note  $X(T) \stackrel{\text{déf}}{=} \text{Hom}_{\text{gr}}(T, \mathbb{G}_m)$  le groupe des caractères algébriques de  $T$ ,  $X^\vee(T) \stackrel{\text{déf}}{=} \text{Hom}_{\text{gr}}(\mathbb{G}_m, T) \cong \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(X(T), \mathbb{Z})$  le groupe des cocaractères,  $(X(T), R, X^\vee(T), R^\vee)$  la donnée radicielle de  $(G, T)$ ,  $R^+ \subset X(T)$  les racines positives relativement à  $B$ ,  $S \subset R^+$  les racines simples et  $R^{\vee+}$ ,  $S^\vee$  les coracines correspondantes. Pour  $\alpha \in R^+$ , on note  $N_\alpha \subseteq N$  le sous-groupe radical (commutatif) associé et, pour  $\alpha \in S$ , on fixe un isomorphisme  $\iota_\alpha : N_\alpha \xrightarrow{\sim} \mathbb{G}_a$  de groupes algébriques sur  $L$  tel que (cf. [Jantzen 2003, §II.1.2]) :

$$\iota_\alpha(tn_\alpha t^{-1}) = \alpha(t)\iota_\alpha(n_\alpha) \quad \forall t \in T, \quad \forall n_\alpha \in N_\alpha. \tag{9}$$

L'application produit donne un isomorphisme de variétés algébriques sur  $L$  (pour un ordre quelconque des  $\alpha$ )  $\prod_{\alpha \in R^+} N_\alpha \xrightarrow{\sim} N$ . L'isomorphisme inverse composé avec la projection sur  $\prod_{\alpha \in S} N_\alpha$ , vu comme groupe produit commutatif, induit une surjection  $N \rightarrow \prod_{\alpha \in S} N_\alpha$  de groupes algébriques sur  $L$ . Comme dans [Schneider et Vignéras 2011, §5] on note  $\ell$  la composée :

$$N \rightarrow \prod_{\alpha \in S} N_\alpha \xrightarrow{\sum_{\alpha \in S} \iota_\alpha} \mathbb{G}_a,$$

qui est un morphisme de groupes algébriques sur  $L$ .

On suppose désormais que le centre  $Z_G$  de  $G$  est connexe. Par [Breuil et Herzig 2015, Proposition 2.1.1] (par exemple), il existe un cocaractère  $\xi \in X^\vee(T)$  tel que  $\alpha \circ \xi = \text{Id}_{\mathbb{G}_m}$  pour toute racine simple  $\alpha$  (prendre  $\xi = \sum_{\alpha^\vee \in S^\vee} \lambda_{\alpha^\vee}$  où les  $\lambda_{\alpha^\vee}$  sont des cocaractères fondamentaux). Un tel cocaractère n'est pas unique mais tout autre est de la forme  $\xi + \zeta$  (en notation additive) où  $\zeta \in X^\vee(Z_G) \subseteq X^\vee(T)$ . On fixe un tel cocaractère  $\xi$  dans la suite. Si  $n = \prod_{\alpha \in R^+} n_\alpha \in N$  et  $x \in \mathbb{G}_m$ , on a :

$$\begin{aligned} \ell(\xi(x)n\xi(x^{-1})) &= \ell\left(\prod_{\alpha \in R^+} \xi(x)n_\alpha\xi(x^{-1})\right) \\ &= \sum_{\alpha \in S} \iota_\alpha(\xi(x)n_\alpha\xi(x^{-1})) = \sum_{\alpha \in S} \alpha(\xi(x))\iota_\alpha(n_\alpha) = x\ell(n). \end{aligned} \tag{10}$$

On fixe un sous-groupe ouvert compact  $N_0 \subset N(L)$  que l'on suppose *totale-ment décomposé* comme dans [Schneider et Vignéras 2011], c'est-à-dire tel que  $\prod_{\alpha \in R^+} N_\alpha \xrightarrow{\sim} N$  induit une bijection  $\prod_{\alpha \in R^+} N_\alpha(L) \cap N_0 \xrightarrow{\sim} N_0$  pour tout ordre sur les  $\alpha \in R^+$ . Le morphisme  $\ell$  induit un morphisme de groupes encore noté  $\ell : N_0 \rightarrow L$  et on définit :

$$N_1 \stackrel{\text{déf}}{=} \text{Ker}(N_0 \xrightarrow{\ell} L \xrightarrow{\text{Tr}_{L/\mathbb{Q}_p}} \mathbb{Q}_p) \tag{11}$$

qui est un sous-groupe compact distingué de  $N_0$ . Lorsque  $N \neq 0$ , i.e., lorsque  $G \neq T$ , le groupe  $N_0/N_1$  s'identifie à un sous- $\mathbb{Z}_p$ -module (libre de rang 1) de  $\mathbb{Q}_p$ , et donc est isomorphe à  $\mathbb{Z}_p$ .

**Lemme 3.1.** *On a :*

$$\xi(\mathbb{Z}_p \setminus \{0\}) \subseteq \{t \in T(L), tN_0t^{-1} \subseteq N_0\}$$

et :

$$\xi(\mathbb{Z}_p \setminus \{0\}) \subseteq \{t \in T(L), tN_1t^{-1} \subseteq N_1\}.$$

*Démonstration.* La première inclusion découle de (9), de l'égalité  $\alpha(\xi(x)) = x$  et du fait que  $N_0$  est totalement décomposé. La deuxième découle de la première, de (10) et du fait que la trace est  $\mathbb{Z}_p$ -linéaire.  $\square$

Soit  $\pi$  une représentation lisse de  $B(L)$  sur un  $A$ -module. De manière analogue à [Emerton 2010, Definition 3.1.3], on munit le  $A[[N_0/N_1]]$ -module  $\pi^{N_1}$  d'une action (de Hecke)  $A$ -linéaire du monoïde  $\mathbb{Z}_p \setminus \{0\}$  comme suit :

$$x \cdot_\xi v \stackrel{\text{déf}}{=} \sum_{n_1 \in N_1/\xi(x)N_1\xi(x^{-1})} n_1\xi(x)v \in \pi^{N_1}, \tag{12}$$

l'indice  $\xi$  rappelant que cela dépend du choix du cocaractère  $\xi$  (notons que cela a bien un sens par le lemme 3.1). Cette action est  $A[[N_0/N_1]]$ -semi-linéaire car on vérifie que l'on a :

$$x \cdot_\xi \left( \sum_i a_i[n_i] \right) v = \left( \sum_i a_i[\xi(x)n_i\xi(x^{-1})] \right) (x \cdot_\xi v)$$

pour  $x \in \mathbb{Z}_p \setminus \{0\}$ ,  $\sum_i a_i[n_i] \in A[[N_0/N_1]]$  et  $v \in \pi^{N_1}$ . Si  $x \in \mathbb{Z}_p^\times$ , (12) donne simplement  $x \cdot_\xi v = \xi(x)v$ .

On fixe un isomorphisme  $N_0/N_1 \cong \mathbb{Z}_p$  lorsque  $G \neq T$ . En envoyant  $F$  sur l'endomorphisme (12) pour  $x = p \in \mathbb{Z}_p \setminus \{0\}$ , en faisant agir  $A[[X]]$  via  $A[[X]]/(X)$  si  $G = T$ , via l'isomorphisme  $A[[X]] \cong A[[\mathbb{Z}_p]] \cong A[[N_0/N_1]]$  envoyant  $X$  sur  $[1] - 1$  si  $G \neq T$ , et en faisant agir  $\mathbb{Z}_p^\times$  via (12), on vérifie avec (10) que l'on munit  $\pi^{N_1}$  d'une structure de  $A[[X]][[F]]$ -module avec action lisse de  $\mathbb{Z}_p^\times$  qui en fait un objet de la catégorie  $\text{Mod}_A$  (cf. §2, cette structure dépend donc du choix de  $\xi$ ). On dispose donc de l'ensemble  $\mathcal{M}(\pi^{N_1})$  des sous- $A[[X]][[F]]$ -modules  $M$  de  $\pi^{N_1}$  stables par  $\mathbb{Z}_p^\times$  et vérifiant (1). Lorsque  $G = T$  (ou de manière équivalente  $B = T$ ),  $X$  agit par 0, et  $\mathcal{M}(\pi^{N_1}) = \mathcal{M}(\pi)$  est l'ensemble des sous- $A$ -modules de type fini de  $\pi$  stables par l'action de  $\xi(\mathbb{Q}_p^\times)$ , ou de manière équivalente de  $\xi(\mathbb{Z}_p \setminus \{0\})$ . Lorsque  $G \neq T$ , l'ensemble  $\mathcal{M}(\pi^{N_1})$  est mystérieux en général (par exemple on ignore s'il est non vide), voir la remarque 3.3.

Supposons d'abord  $G \neq T$ . Si  $M \in \mathcal{M}(\pi^{N_1})$ , rappelons que  $D^\vee(M) = M^\vee[1/X]$  muni de sa structure d'objet de  $\Phi\Gamma_A^{\text{ét}}$  (lemme 2.6).

Supposons ensuite  $G = T$ . Si  $M \in \mathcal{M}(\pi^{N_1}) = \mathcal{M}(\pi)$ , l'action de  $\mathbb{Q}_p^\times$  via  $\xi$  sur  $M$  se factorise par un quotient fini (car  $M$  est de cardinal fini) et en particulier s'étend par continuité via la réciprocity locale en une action continue de  $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p)$ . On note  $D^\vee(M)$  le  $(\varphi, \Gamma)$ -module de la représentation *duale* de  $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p)$  (via le foncteur covariant de [Fontaine 1990, théorème A.3.4.3]), c'est-à-dire par le lemme 7.5 ci-dessous  $D^\vee(M) = A[[X]][[1/X]] \otimes_A M^\vee$  où l'action de  $\Gamma \cong \mathbb{Z}_p^\times$  est l'unique action  $A[[X]][[1/X]]$ -semi-linéaire telle que  $x(f)(m) = f(\xi(x^{-1})(m))$  et  $\varphi$  est l'unique endomorphisme  $A[[X]][[1/X]]$ -semi-linéaire tel que  $\varphi(f)(m) = f(\xi(p^{-1})(m))$  avec  $f \in M^\vee$ ,  $x \in \mathbb{Z}_p^\times$  et  $m \in M$ . Notons que dans ce cas  $D^\vee(M)$  n'est pas  $M^\vee[[1/X]]$  (qui est nul).

Pour toute représentation lisse  $\pi$  de  $B(L)$  sur un  $A$ -module, on pose :

$$D_\xi^\vee(\pi) \stackrel{\text{déf}}{=} \varprojlim_{M \in \mathcal{M}(\pi^{N_1})} D^\vee(M) \cong \varprojlim_{M \in \mathcal{M}(\pi^{N_1})} (M^\vee[[1/X]]), \tag{13}$$

autrement dit  $D_\xi^\vee(\pi) = D^\vee(\pi^{N_1})$  si  $G \neq T$  avec les notations de (4).

**Proposition 3.2.** (i) Pour tout  $\pi$ ,  $D_\xi^\vee(\pi)$  est un objet de  $\widehat{\Phi}\Gamma_A^{\text{ét}}$  et  $\pi \mapsto D_\xi^\vee(\pi)$  induit un foncteur contravariant de la catégorie des représentations lisses de  $B(L)$  sur  $A$  vers la catégorie  $\widehat{\Phi}\Gamma_A^{\text{ét}}$ .

(ii) Si  $0 \rightarrow \pi' \rightarrow \pi \rightarrow \pi''$  est une suite exacte de représentations lisses de  $B(L)$  sur  $A$ , alors  $D_\xi^\vee(\pi'') \rightarrow D_\xi^\vee(\pi) \rightarrow D_\xi^\vee(\pi') \rightarrow 0$  est une suite exacte dans  $\widehat{\Phi}\Gamma_A^{\text{ét}}$ .

(iii) Lorsque  $G(L) = \text{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$  et  $\pi$  est la restriction à  $B(\mathbb{Q}_p)$  d'une représentation de longueur finie de  $\text{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$  sur  $A$ , le foncteur  $D_\xi^\vee$  coïncide (à torsion près) avec le foncteur défini dans [Colmez 2010].

*Démonstration.* (i) Clair par le (i) de la proposition 2.7.

(ii) Cela découle du (ii) de la proposition 2.7 appliqué à la suite exacte dans  $\text{Mod}_A$  :  $0 \rightarrow \pi'^{N_1} \rightarrow \pi^{N_1} \rightarrow \pi''^{N_1}$ .

(iii) Nous utilisons certains résultats de [Emerton 2008] qui ne sont écrits là que pour  $A = \mathcal{O}_E/(\varpi_E)$  mais dont les preuves s'étendent directement à  $A = \mathcal{O}_E/(\varpi_E^n)$  (voir aussi [Colmez 2010; Berger et Vienney 2014]). Lorsque  $\pi$  est la restriction à  $B(\mathbb{Q}_p)$  d'une représentation admissible de  $\text{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$  sur  $A$ , alors  $\pi$  satisfait la propriété Ad (définition 2.2). En effet, un sous- $A[[X]][[F]]$ -module de type fini de  $\pi$  est toujours contenu dans un des modules de type fini  $M(V, V_0)$  de [Emerton 2008, Définition 4.1] qui est admissible par [loc. cit., Theorem 4.7]. Par ailleurs si  $M \in \mathcal{M}(\pi)$  contient un sous- $A$ -module de type fini stable par  $\text{GL}_2(\mathbb{Z}_p)\mathbb{Q}_p^\times$  qui engendre  $\pi$  sous  $\text{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$ , alors le  $(\varphi, \Gamma)$ -module  $D^\vee(M)$  ne dépend plus de  $M$  (voir [loc. cit., preuve de la Prop. 4.4 et Rem. 4.8]). Lorsque  $\pi$  est de longueur finie comme représentation de  $\text{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$ , donc en particulier de type fini et admissible,

ceci est toujours vérifié pour un sous- $A[[X]][F]$ -module de type fini de  $\pi$  stable par  $\mathbb{Z}_p^\times$  assez grand. On en déduit  $D_\xi^\vee(\pi) = D^\vee(M) \in \Phi\Gamma_A^{\text{ét}}$ , d'où le résultat.  $\square$

**Remarque 3.3.** Comme rien, ou presque, n'est connu sur  $\mathcal{M}(\pi^{N_1})$  en dehors du cas  $\text{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$ , j'ignore en général si  $D_\xi^\vee(\pi)$  est non nul ou s'il est de longueur finie (i.e., dans  $\Phi\Gamma_A^{\text{ét}}$ ). Notons que Schraen montre dans [Schraen 2012–14], par un calcul explicite faisant intervenir certains des diagrammes de [Breuil et Paškūnas 2012, §13], que, au moins lorsque  $L$  est l'extension quadratique non ramifiée de  $\mathbb{Q}_p$ , alors  $D_\xi^\vee(\pi)$  est non nul pour les représentations supersingulières de  $\text{GL}_2(L)$  sur  $k_E$  qui apparaissent dans [Breuil et Paškūnas 2012, Theorem 19.10]. Ces calculs sont étendus par Morra et Schraen dans [Morra et Schraen ≥ 2015] à des cas où  $L$  est non ramifiée de degré 3. Rappelons les deux questions naturelles qui se posent sur  $\mathcal{M}(\pi^{N_1})$  lorsque, disons,  $\pi$  est une représentation lisse admissible de  $G(L)$  sur  $A$  de longueur finie (comme représentation de  $G(L)$ ) :

- (1) Est-ce que  $\mathcal{M}(\pi^{N_1})$  coïncide avec l'ensemble des sous- $A[[X]][F]$ -modules de type fini de  $\pi^{N_1}$  stables par  $\mathbb{Z}_p^\times$  (de manière équivalente puisque l'action de  $\mathbb{Z}_p^\times$  est lisse : est-ce que le  $A[[X]][F]$ -module  $\pi^{N_1}$  satisfait la propriété Ad) ?
- (2) Est-ce que  $D_\xi^\vee(\pi) \in \Phi\Gamma_A^{\text{ét}}$  (de manière équivalente puisque les objets de  $\Phi\Gamma_A^{\text{ét}}$  sont de longueur finie : est-ce que  $D^\vee(M)$  se “stabilise” pour  $M \in \mathcal{M}(\pi^{N_1})$  assez grand) ?

Pour  $\pi$  représentation lisse de  $B(L)$  sur  $A$ , on peut par ailleurs aussi considérer les groupes de cohomologie continue  $H^i(N_1, \pi)$  pour  $i \geq 1$ . Ils sont nuls si  $G = T$  (puisque  $N_1$  est nul), mais si  $G \neq T$  ils sont naturellement munis d'une structure d'objet de  $\text{Mod}_A$  via l'isomorphisme  $A[[X]] \cong A[[N_0/N_1]]$  où l'action de  $N_0$  (qui se factorise par  $N_0/N_1$ ) est induite par l'application  $\phi \rightarrow n_0(\phi)$  envoyant une cochaîne continue  $\phi : N_1^i \rightarrow \pi$  sur la cochaîne  $n_0(\phi)(\cdot) \stackrel{\text{déf}}{=} n_0(\phi(n_0^{-1} \cdot n_0))$  et où l'action de  $\xi(x)$  pour  $x \in \mathbb{Z}_p \setminus \{0\}$  (donnant l'action de  $F = \xi(p)$  et de  $\mathbb{Z}_p^\times$ ) est la composée :

$$H^i(N_1, \pi) \xrightarrow{\xi(x)} H^i(\xi(x)N_1\xi(x^{-1}), \pi) \longrightarrow H^i(N_1, \pi) \tag{14}$$

la première flèche étant induite par l'action de  $\xi(x)$  sur  $\pi$  et la deuxième étant la corestriction de  $\xi(x)N_1\xi(x^{-1})$  à  $N_1$  (voir, e.g., [Hauseux 2014, §3.1], noter que cette deuxième flèche est l'identité si  $x \in \mathbb{Z}_p^\times$ ). On dispose donc pour tout  $i \geq 1$  de foncteurs contravariants  $\pi \mapsto D^\vee(H^i(N_1, \pi))$  de la catégorie des représentations lisses de  $B(L)$  sur  $A$  vers la catégorie  $\widehat{\Phi\Gamma}_A^{\text{ét}}$ .

**Remarque 3.4.** La catégorie des représentations lisses de  $B(L)$  sur  $A$  ayant assez d'injectifs, on peut aussi considérer les foncteurs dérivés  $R^i D_\xi^\vee$  du foncteur contravariant exact à droite  $D_\xi^\vee$ . La question du lien éventuel entre les foncteurs  $D^\vee(H^i(N_1, \pi))$  et  $R^i D_\xi^\vee$  n'est pas abordée dans cet article.

Lorsque  $\pi$  est une représentation lisse de  $G(L)$  sur  $A$ , on commet dans la suite l'abus de notation  $D_\xi^\vee(\pi) = D_\xi^\vee(\pi|_{B(L)})$ .

### 4. Indépendance des choix

On montre que le foncteur  $D_\xi^\vee$  dépend seulement du choix de  $\xi$ .

On conserve les notations des sections précédentes.

Si  $G = T$ , il n'y a que le choix de  $\xi$  qui intervient, on suppose donc  $G \neq T$ .

Soit  $\pi$  une représentation lisse de  $B(L)$  sur  $A$ . Nous allons montrer que  $D_\xi^\vee(\pi)$  en tant qu'objet de  $\widehat{\Phi\Gamma}_A^{\text{ét}}$  ne dépend pas des choix des  $(\iota_\alpha)_{\alpha \in S}$  satisfaisant (9), du sous-groupe ouvert compact  $N_0 \subseteq N(L)$  totalement décomposé et de l'isomorphisme  $N_0/N_1 \cong \mathbb{Z}_p$ , et ce de manière fonctorielle en  $\pi$ . Rappelons que  $(\iota_\alpha)_{\alpha \in S}$  et  $N_0$  déterminent  $N_1$  par (11).

Notons déjà que, à  $(\iota_\alpha)_{\alpha \in S}$  et  $N_0$  fixés, comme tout automorphisme de  $\mathbb{Z}_p$ -module de  $\mathbb{Z}_p$  est de la forme  $x \mapsto ax$  pour  $a \in \mathbb{Z}_p^\times$ , c'est un exercice trivial (laissé au lecteur) que l'objet  $\pi^{N_1}$  de  $\text{Mod}_A$ , et donc *a fortiori*  $D_\xi^\vee(\pi)$ , ne dépendent pas de l'isomorphisme choisi  $N_0/N_1 \cong \mathbb{Z}_p$ . On ne se préoccupe donc plus du choix d'un tel isomorphisme dans la suite.

Fixons  $(\iota_\alpha)_{\alpha \in S}$  et soit  $N_0, N'_0$  deux sous-groupes ouverts compacts de  $N(L)$  totalement décomposés. Notons  $s : N_0 \twoheadrightarrow \mathbb{Z}_p$  la surjection induite par l'isomorphisme fixé  $N_0/N_1 \cong \mathbb{Z}_p$ . Quitte à remplacer  $N'_0$  par  $N_0 \cap N'_0$  (encore totalement décomposé), on peut supposer  $N'_0 \subseteq N_0$ . On note  $m$  l'entier  $\geq 0$  tel que  $s(N'_0) = p^m \mathbb{Z}_p$ . On a  $N'_0 \subseteq N''_0 \subseteq N_0$  où  $N''_0 \stackrel{\text{déf}}{=} s^{-1}(p^m \mathbb{Z}_p)$  et il suffit de passer de  $N_0$  à  $N''_0$ , puis de  $N''_0$  à  $N'_0$ . Autrement dit, en remarquant que  $N_1 = \text{Ker}(s : N''_0 \twoheadrightarrow p^m \mathbb{Z}_p)$  et en posant  $N'_1 \stackrel{\text{déf}}{=} \text{Ker}(s : N'_0 \twoheadrightarrow p^m \mathbb{Z}_p)$ , il suffit de traiter les deux cas suivants : le cas  $N'_1 = N_1$  (mais  $m \geq 0$ ), le cas  $m = 0$  (mais  $N'_1 \subseteq N_1$ ).

Commençons par le cas  $m = 0$ .

**Lemme 4.1.** *L'application :*

$$j_{N'_1, N_1} : \pi^{N'_1} \rightarrow \pi^{N_1}, \quad v \mapsto \sum_{n_1 \in N_1/N'_1} n_1 v \tag{15}$$

*est un morphisme dans  $\text{Mod}_A$ .*

*Démonstration.* Comme l'inclusion  $N'_0 \subseteq N_0$  induit  $N'_0/N'_1 \xrightarrow{\sim} N_0/N_1$  (car  $m = 0$ ), il suffit de vérifier la commutation de  $j_{N'_1, N_1}$  à l'action de  $N'_0$  pour avoir sa commutation à l'action de  $A[[X]]$ . Cette commutation est claire car, si  $(n_{1,i})_{i \in I}$  est un système de représentants de  $N_1/N'_1$  dans  $N_1$ , alors  $(n'_0{}^{-1}n_{1,i}n'_0)_{i \in I}$  en est un autre pour tout  $n'_0 \in N'_0$  puisque  $N'_1$  est distingué dans  $N'_0$ . La commutativité à l'action de  $\xi(\mathbb{Z}_p^\times)$  est aussi claire puisque  $(\xi(x)^{-1}n_{1,i}\xi(x))_{i \in I}$  est un système de représentants de  $N_1/N'_1$  dans  $N_1$  pour tout  $x \in \mathbb{Z}_p^\times$ . Rappelons que, si  $G'' \subseteq G' \subseteq G$  sont trois groupes et si  $(g'_i)_{i \in I'}$ ,  $(g_i)_{i \in I}$  sont des systèmes de représentants respectivement

dans  $G'$  et dans  $G$  de  $G'/G''$  et de  $G/G'$ , alors  $(g_i g'_{i'})_{(i,i') \in I \times I'}$  est un système de représentants dans  $G$  de  $G/G''$ . En appliquant cela à  $\xi(p)N'_1\xi(p^{-1}) \subseteq N'_1 \subseteq N_1$  et  $\xi(p)N'_1\xi(p^{-1}) \subseteq \xi(p)N_1\xi(p^{-1}) \subseteq N_1$ , on obtient :

$$(j_{N'_1, N_1} \circ F)(v) = (F \circ j_{N'_1, N_1})(v) = \sum_{n_1 \in N_1/\xi(p)N'_1\xi(p^{-1})} n_1 \xi(p)v,$$

qui donne la commutativité à l'action de  $F$ . □

**Lemme 4.2.** (i) Soit  $M' \in \mathcal{M}(\pi^{N'_1})$  et  $M \stackrel{\text{déf}}{=} j_{N'_1, N_1}(M') \in \mathcal{M}(\pi^{N_1})$  son image par  $j_{N'_1, N_1}$ . Alors  $\text{Ker}(M' \rightarrow M)$  est un  $A[F]$ -module de torsion.

(ii) Soit  $M \in \mathcal{M}(\pi^{N_1})$ , alors il existe  $M' \in \mathcal{M}(\pi^{N'_1})$  tel que l'on a une suite exacte dans  $\text{Mod}_A$  :

$$0 \longrightarrow M'' \longrightarrow M' \xrightarrow{j_{N'_1, N_1}} M \longrightarrow M/M' \longrightarrow 0$$

avec  $M''$  et  $M/M'$  de torsion comme  $A[F]$ -modules.

*Démonstration.* (i) Notons d'abord que  $M$  est dans  $\mathcal{M}(\pi^{N_1})$  par le [lemme 4.1](#) et le (i) du [lemme 2.1](#). Soit  $d \geq 0$  tel que  $\xi(p^d)N_0\xi(p^{-d}) \subseteq N'_0$  (un tel entier  $d$  existe car  $\xi(p^d)N_\alpha(L) \cap N_0\xi(p^{-d}) = \alpha(\xi(p^d))N_\alpha(L) \cap N_0 \subseteq p^d N_\alpha(L) \cap N_0$  pour tout  $\alpha \in R^+$ , en voyant  $N_\alpha(L) \cap N_0$  comme  $\mathbb{Z}_p$ -module). On a donc  $\xi(p^d)N'_1\xi(p^{-d}) \subseteq \xi(p^d)N_1\xi(p^{-d}) \subseteq N'_1$  d'où on déduit de manière similaire à la fin de la preuve du [lemme 4.1](#) que l'endomorphisme de  $\pi^{N'_1}$  :

$$F^d = F \circ \dots \circ F = \sum_{n'_1 \in N'_1/\xi(p^d)N'_1\xi(p^{-d})} n'_1 \xi(p^d)$$

se factorise comme suit :

$$\pi^{N'_1} \xrightarrow{j_{N'_1, N_1}} \pi^{N_1} \xrightarrow{\phi_{N'_1, N_1}} \pi^{N'_1}$$

où  $\phi_{N'_1, N_1}$  envoie  $v \in \pi^{N_1}$  sur  $\sum_{n'_1 \in N'_1/\xi(p^d)N_1\xi(p^{-d})} n'_1 \xi(p^d)v \in \pi^{N'_1}$ . En particulier  $\text{Ker}(j_{N'_1, N_1} : M' \rightarrow M) \subseteq \text{Ker}(F^d : M' \rightarrow M')$  est un  $A[F]$ -module de torsion.

(ii) Comme dans la preuve du (i) mais en considérant cette fois  $\xi(p^d)N_1\xi(p^{-d}) \subseteq N'_1 \subseteq N_1$  on en déduit que l'endomorphisme  $F^d$  de  $\pi^{N_1}$  se factorise par :

$$\pi^{N_1} \xrightarrow{\phi_{N'_1, N_1}} \pi^{N'_1} \xrightarrow{j_{N'_1, N_1}} \pi^{N_1}. \tag{16}$$

Noter que  $\phi_{N'_1, N_1}$  commute à  $F$  (comme à la fin de la preuve du [lemme 4.1](#), considérer  $\xi(p^{d+1})N_1\xi(p^{-d-1}) \subseteq \xi(p^d)N_1\xi(p^{-d}) \subseteq N'_1$  et  $\xi(p^{d+1})N_1\xi(p^{-d-1}) \subseteq \xi(p)N'_1\xi(p^{-1}) \subseteq N'_1$ ) et est  $\varphi^d$ -semi-linéaire (pour le Frobenius  $\varphi$  sur  $A[[X]]$ ). On en déduit que le sous- $A[[X]]$ -module  $M'$  de  $\pi^{N'_1}$  engendré par  $\phi_{N'_1, N_1}(M)$  est un  $A[[X]][F]$ -module de type fini et que l'on a une surjection  $A[[X]]$ -linéaire :

$$\text{Id} \otimes \phi_{N'_1, N_1} : A[[X]] \otimes_{\varphi^d, A[[X]]} M \twoheadrightarrow M'.$$

Comme  $A[[X]] \otimes_{\varphi^d, A[[X]]} M$  est un  $A[[X]]$ -module admissible (car  $(A[[X]] \otimes_{\varphi^d, A[[X]]} M)^\vee \cong A[[X]] \otimes_{\varphi^d, A[[X]]} M^\vee$ ), on en déduit que  $M'$  est admissible comme  $A[[X]]$ -module, donc est dans  $\mathcal{M}(\pi^{N'_1})$ . On déduit aussi de la factorisation (16) et du fait que  $j_{N'_1, N_1}$  est  $A[[X]]$ -linéaire que l'on a  $F^d(M) \subseteq j_{N'_1, N_1}(M') \subseteq M$ , et donc que  $M/j_{N'_1, N_1}(M')$  est annihilé par  $F^d$ . Le fait que  $M'' = \text{Ker}(j_{N'_1, N_1} : M' \rightarrow M)$  est de  $A[F]$ -torsion résulte du (i).  $\square$

On déduit facilement du lemme 4.2 et du commentaire qui suit la proposition 2.7 que  $j_{N'_1, N_1}$  induit un isomorphisme dans  $\widehat{\Phi\Gamma}_A^{\text{ét}}$  :

$$\varprojlim_{M \in \mathcal{M}(\pi^{N_1})} D^\vee(M) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{M' \in \mathcal{M}(\pi^{N'_1})} D^\vee(M')$$

qui est clairement fonctoriel en  $\pi$ .

Considérons maintenant le cas  $N'_1 = N_1$ , qui implique  $N'_0 = s^{-1}(p^m \mathbb{Z}_p)$ . On a une suite exacte par (10) :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & N_1 & \longrightarrow & N'_0 & \xrightarrow{s} & p^m \mathbb{Z}_p \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & \xi(p^m)N_1\xi(p^{-m}) & \longrightarrow & \xi(p^m)N_0\xi(p^{-m}) & \xrightarrow{s} & p^m \mathbb{Z}_p \longrightarrow 0 \end{array}$$

où les flèches verticales sont des inclusions. Par le cas  $m = 0$ , on sait que  $N'_0$  et  $\xi(p^m)N_0\xi(p^{-m})$  donnent le même foncteur  $D_\xi^\vee$ . On est donc ramené à comparer les foncteurs pour  $N_0$  et  $\xi(p^m)N_0\xi(p^{-m})$ . Il suffit de vérifier que  $\pi^{N_1}$  et  $\pi^{\xi(p^m)N_1\xi(p^{-m})}$  (ce dernier avec l'action induite de  $\xi(p^m)N_0\xi(p^{-m})$ ) sont isomorphes de manière fonctorielle dans  $\text{Mod}_A$ . Le lecteur pourra vérifier que l'application :

$$\pi^{N_1} \rightarrow \pi^{\xi(p^m)N_1\xi(p^{-m})}, \quad v \mapsto \xi(p^m)v$$

induit bien un tel isomorphisme.

Fixons maintenant  $N_0$  et soit  $(t_\alpha)_{\alpha \in S}, (t'_\alpha)_{\alpha \in S}$  satisfaisant (9). Soit  $\ell, \ell'$  comme au § 3 (avec des notations évidentes) et  $N'_1 \subset N_0$  le sous-groupe défini par (11) avec  $\ell'$  au lieu de  $\ell$ . Par le même argument que [Schneider et Vignéras 2011, §7, p. 27], il existe  $t \in T(L)$  tel que  $\ell' = \ell(t^{-1} \cdot t)$ . Par ce que l'on a démontré ci-dessus, on obtient le même foncteur si l'on travaille avec  $N_0$  et  $(t'_\alpha)_{\alpha \in S}$  ou avec  $tN_0t^{-1}$  et  $(t'_\alpha)_{\alpha \in S}$ . Il suffit donc de montrer que les  $D_\xi^\vee$  obtenus avec  $N_0$  et  $(t_\alpha)_{\alpha \in S}$  d'une part,  $tN_0t^{-1}$  et  $(t'_\alpha)_{\alpha \in S}$  d'autre part sont les mêmes. Pour cela il suffit de montrer que  $\pi^{N_1}$  et  $\pi^{tN_1t^{-1}}$  (ce dernier avec l'action induite de  $tN_0t^{-1}$ ) sont isomorphes (de manière fonctorielle) dans  $\text{Mod}_A$ . Comme précédemment, l'application  $(\pi^{N_1} \rightarrow \pi^{tN_1t^{-1}}, v \mapsto tv)$  induit un tel isomorphisme.

**Remarque 4.3.** Soit  $\xi'$  un autre choix de cocaractère, il existe  $\zeta : \mathbb{G}_m \rightarrow Z_G$  tel que  $\xi'(x) = \zeta(x)\xi(x)$  pour  $x \in L^\times$  (voir § 3). Lorsque  $Z_G(L)$  agit sur  $\pi$  par un

caractère  $\chi_\pi : Z_G(L) \rightarrow A^\times$  (ce qui est le cas dans la plupart des applications), on laisse le lecteur vérifier en utilisant le [lemme 7.5](#) ci-dessous que  $D_{\xi'}^\vee(\pi)$  est isomorphe à  $D_\xi^\vee(\pi)$  tordu par le  $(\varphi, \Gamma)$ -module de l'inverse du caractère lisse :

$$\chi_\pi \circ \zeta : \mathbb{Q}_p^\times \rightarrow A^\times$$

(via la réciprocity locale).

### 5. Compatibilité au produit tensoriel

On montre une compatibilité au produit tensoriel du foncteur  $D_\xi^\vee$ .

On conserve les notations des §§2 et 3.

**Lemme 5.1.** *Soit  $M$  un  $k_E[[X]][F]$ -module de torsion sur  $k_E[[X]]$ . On suppose :*

- (i)  $M^\vee \cong k_E[[X]]^d$  pour  $d > 0$  comme  $k_E[[X]]$ -module ;
- (ii) *il existe une suite d'entiers positifs  $(N_n)_{n>0}$  croissante et non bornée telle que, pour tout  $n > 0$ , il existe  $v_n \in M[X^{N_n}] \setminus M[X^{N_n-1}]$  avec  $F(v_n) \in M[X^{N_n}]$ .*

Alors il existe un sous- $k_E[[X]]$ -module admissible  $M' \subseteq M$  tel que  $M'^\vee \cong k_E[[X]]$  et  $F(m') = 0$  pour tout  $m' \in M'$ .

*Démonstration.* Par la dualité modules compacts - modules discrets [[Gabriel 1962](#), §IV.4] l'hypothèse (i) est équivalente à :

$$M \cong \left( \varinjlim_n k_E[X]/(X^n) \right)^d \cong (k_E[[X]][1/X]/k_E[[X]])^d.$$

Pour tout  $i > n$ , on a  $X^{N_i-N_n} v_i \in M[X^{N_n}] \setminus M[X^{N_n-1}]$  et :

$$F(X^{N_i-N_n} v_i) = X^{p(N_i-N_n)} F(v_i) \in X^{p(N_i-N_n)} M[X^{N_i}] \subseteq M[X^{N_n}].$$

Comme  $M[X^{N_n}]$  est un ensemble fini (car  $k_E$  est fini et  $M$  est admissible), quitte à remplacer  $v_n$  par l'un des  $X^{N_i-N_n} v_i$  pour  $i > n$  on peut supposer par un procédé diagonal que l'on a  $v_n = X^{N_i-N_n} v_i$  pour tout  $n > 0$  et tout  $i > n$ . Le sous- $k_E[[X]]$ -module  $M'$  de  $M$  engendré par les  $v_n$  pour  $n > 0$  est alors clairement isomorphe à  $\varinjlim_n k_E[X]/(X^{N_n}) \cong k_E[[X]][1/X]/k_E[[X]]$ . Par ailleurs, comme pour tout  $i > n$  :

$$F(v_n) = F(X^{N_i-N_n} v_i) \in X^{(p-1)(N_i-N_n)} M[X^{N_n}],$$

on en déduit  $F(v_n) = 0$  pour tout  $n > 0$  puisque  $(p-1)(N_i-N_n) \rightarrow +\infty$  quand  $i \rightarrow +\infty$ . Ceci achève la preuve. □

**Lemme 5.2.** *Soit  $M$  un  $A[[X]][F]$ -module de torsion sur  $A[[X]]$ . On suppose :*

- (i)  $M$  est admissible comme  $A[[X]]$ -module ;
- (ii) *l'application  $\text{Id} \otimes F : A[[X]] \otimes_{\varphi, A[[X]]} M \rightarrow M$  induit un isomorphisme comme en (3) en dualisant puis en inversant  $X$ .*

Alors  $M$  est un  $A[[X]][F]$ -module de type fini.

*Démonstration.* Soit  $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$  une suite exacte de  $A[[X]][F]$ -modules de torsion sur  $A[[X]]$  avec  $M$  comme dans l'énoncé. En particulier  $M'$  et  $M''$  sont aussi admissibles comme  $A[[X]]$ -modules. Comme  $\varphi : A[[X]] \rightarrow A[[X]]$  est plat et comme la localisation est exacte, les applications  $\text{Id} \otimes F$  induisent un diagramme commutatif de suites exactes courtes de  $A[[X]][1/X]$ -modules :

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & M''^\vee[1/X] & \longrightarrow & M^\vee[1/X] & \longrightarrow & M'^\vee[1/X] \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \rightarrow & (A[[X]] \otimes_{\varphi, A[[X]]} M'')^\vee[\frac{1}{X}] & \rightarrow & (A[[X]] \otimes_{\varphi, A[[X]]} M)^\vee[\frac{1}{X}] & \rightarrow & (A[[X]] \otimes_{\varphi, A[[X]]} M')^\vee[\frac{1}{X}] \rightarrow 0
 \end{array}$$

où l'application verticale du milieu est un isomorphisme par hypothèse. On en déduit que l'application verticale de droite est surjective, donc est un isomorphisme puisque les deux  $A[[X]][1/X]$ -modules sont de même longueur (finie). La flèche verticale de gauche est donc aussi un isomorphisme. Comme  $M$  est un  $A[[X]][F]$ -module de type fini si et seulement si  $M'$  et  $M''$  le sont, on voit que par dévissage on est ramené à montrer le lemme pour  $A = k_E$ , ce que l'on suppose désormais.

Comme  $M$  est admissible, on a :

$$M^\vee \cong k_E[[X]]^d \oplus (M^\vee)_{\text{tors}}$$

où  $d \geq 0$  et  $(M^\vee)_{\text{tors}} \subseteq M^\vee$  est le sous- $k_E[[X]]$ -module de torsion de  $M^\vee$  (de dimension finie sur  $k_E$ ). Comme  $(M^\vee)_{\text{tors}}$  est stable par  $F$  dans  $M^\vee$  (utiliser  $X^n F(f) = F(X^{pn} f)$  si  $f \in M^\vee$ ) et vérifie  $(M^\vee)_{\text{tors}}[1/X] = 0$ , quitte à remplacer  $M$  par  $\text{Ker}(M \rightarrow ((M^\vee)_{\text{tors}})^\vee)$  on peut supposer  $M^\vee \cong k_E[[X]]^d$  et  $d > 0$ . En particulier on a alors  $M[X^n] \setminus M[X^{n-1}] \neq \emptyset$  pour tout  $n > 0$ .

Pour  $n > 0$  soit  $M_n \subseteq M$  le sous- $k_E[[X]][F]$ -module engendré par  $M[X^n]$ . Supposons d'abord que, pour tout  $n > 0$ ,  $M_n^\vee[1/X] = 0$ . Alors  $M_n^\vee$  est un  $k_E[[X]]$ -module de type fini qui est de torsion, donc est de dimension finie sur  $k_E$ . Il en est de même pour  $M_n$  et il existe donc  $R_n \geq n$  tel que  $M_n \subseteq M[X^{R_n}]$ . On en déduit l'existence d'une suite d'entiers positifs  $(R_n)_{n>0}$  telle que  $M_n \subseteq M[X^{R_n}]$  pour tout  $n > 0$ . Montrons l'existence de  $(N_1, v_1)$  tel que  $1 \leq N_1$  et  $v_1 \in M[X^{N_1}] \setminus M[X^{N_1-1}]$  avec  $F(v_1) \in M[X^{N_1}]$ . Soit  $v \in M[X] \setminus \{0\} \subseteq M_1$ , si  $F(v) \in M[X]$  (dans  $M_1$ ), on prend  $N_1 \stackrel{\text{déf}}{=} 1$  et  $v_1 \stackrel{\text{déf}}{=} v$ . Sinon, on regarde  $F(v) \in M_1$ . On a  $F(v) \in M[X^{S_1}] \setminus M[X^{S_1-1}]$  pour un entier  $S_1$  tel que  $2 \leq S_1 \leq R_1$ . Si  $F(F(v)) \in M[X^{S_1}]$ , on prend  $N_1 = S_1$  et  $v_1 = F(v)$ , sinon on recommence avec  $F^2(v) \in M_1$ . Comme  $M_1 \subseteq M[X^{R_1}]$ , on est certain que l'un des  $F^i(v)$  va marcher. En recommençant ce procédé avec  $M_{N_1+1}$  au lieu de  $M_1$ , i.e., en partant de  $v \in M[X^{N_1+1}] \setminus M[X^{N_1}] \subseteq M_{N_1+1}$ , on trouve  $(N_2, v_2)$  tel que  $N_1 < N_2$  et  $v_2 \in M[X^{N_2}] \setminus M[X^{N_2-1}]$  avec  $F(v_2) \in M[X^{N_2}]$ . En continuant on obtient ainsi une suite  $(N_n, v_n)_{n>0}$  comme dans le lemme 5.1. Par le lemme 5.1, il existe un sous- $k_E[[X]]$ -module  $M'$  de  $M$  tel que  $M'^\vee[1/X] \neq 0$  et  $F|_{M'} \equiv 0$  (en particulier  $M'$  est stable par  $F$  dans  $M$ ). Considérons maintenant le diagramme

commutatif de  $k_E[[X]][1/X]$ -espaces vectoriels de dimension finie :

$$\begin{array}{ccc} M^\vee[1/X] & \xrightarrow{(\text{Id} \otimes F)^\vee} & (k_E[[X]] \otimes_{\varphi, k_E[[X]]} M)^\vee[1/X] \\ \downarrow & & \downarrow \\ M'^\vee[1/X] & \xrightarrow{(\text{Id} \otimes F)^\vee} & (k_E[[X]] \otimes_{\varphi, k_E[[X]]} M')^\vee[1/X] \end{array}$$

Comme l'application horizontale du haut est un isomorphisme (par hypothèse) et comme les deux applications verticales sont surjectives (car duales d'injections tensorisées par  $k_E[[X]][1/X]$ ), l'application horizontale du bas est aussi surjective. Mais comme elle est en fait nulle (puisque  $F|_{M'} \equiv 0$ ), on en déduit :

$$0 = (k_E[[X]] \otimes_{\varphi, k_E[[X]]} M')^\vee[1/X] \cong k_E[[X]] \otimes_{\varphi, k_E[[X]]} (M'^\vee[1/X])$$

(cf. le deuxième isomorphisme en (3)), ce qui est une contradiction car  $M'^\vee[1/X]$  ne s'annule pas.

Donc il existe  $n > 0$  tel que  $M_n^\vee[1/X] \neq 0$ . En dévissant comme au début de la preuve selon la suite exacte  $0 \rightarrow M_n \rightarrow M \rightarrow M/M_n \rightarrow 0$  et en remarquant que  $M_n$  est un  $k_E[[X]][F]$ -module de type fini (puisque  $M[X^n]$  est de dimension finie sur  $k_E$ ), on voit qu'il suffit de montrer le lemme pour  $M/M_n$  (pour un  $n > 0$ ) au lieu de  $M$ . Comme  $\dim_{k_E[[X]][1/X]}((M/M_n)^\vee[1/X]) < \dim_{k_E[[X]][1/X]}(M^\vee[1/X]) = d$ , en faisant une récurrence descendante sur  $d$ , on est ainsi ramené à  $d = 0$ , i.e., au cas  $M^\vee \cong (M^\vee)_{\text{tors}}$  que l'on a traité au début.  $\square$

Soit  $N$  et  $N'$  deux objets de  $\text{Mod}_A$ . On munit  $N^\vee$  d'une structure de  $A[[X]][F]$ -module avec action de  $\mathbb{Z}_p^\times$  comme dans la démonstration du [lemme 2.6](#). On note  $\text{Hom}_A^{\text{cont}}(N^\vee, N')$  le  $A$ -module des homomorphismes continus  $A$ -linéaires de  $N^\vee$  dans  $N'$  où  $N^\vee$  est muni de la topologie profinie et  $N'$  de la topologie discrète. Tout  $\mathcal{F} \in \text{Hom}_A^{\text{cont}}(N^\vee, N')$  se factorise donc par un quotient fini de  $N^\vee$ . On munit  $\text{Hom}_A^{\text{cont}}(N^\vee, N')$  d'un endomorphisme  $F$  défini par  $F(\mathcal{F})(f) \stackrel{\text{déf}}{=} F(\mathcal{F}(F(f)))$  et d'une action de  $\mathbb{Z}_p^\times$  par  $x(\mathcal{F})(f) \stackrel{\text{déf}}{=} x(\mathcal{F}(x^{-1}(f)))$  (où  $\mathcal{F} \in \text{Hom}_A^{\text{cont}}(N^\vee, N')$ ,  $f \in N^\vee$  et  $x \in \mathbb{Z}_p^\times$ ). C'est aussi naturellement un  $A[[X]] \otimes_A A[[X]]$  module via  $(S'(X) \otimes S(X) \cdot \mathcal{F})(f) \stackrel{\text{déf}}{=} S'(X)\mathcal{F}(S(X)f)$ .

Soit  $Y \stackrel{\text{déf}}{=} (1+X) \otimes 1 - 1 \otimes (1+X) = X \otimes 1 - 1 \otimes X \in A[[X]] \otimes_A A[[X]]$ , on a  $F(Y) = Y(\sum_{i=0}^{p-1} (1+X)^{p-1-i} \otimes (1+X)^i)$  dans  $A[[X]] \otimes_A A[[X]]$  et on voit que :

$$\begin{aligned} \text{Hom}_A^{\text{cont}}(N^\vee, N')[Y] &\stackrel{\text{déf}}{=} \{\mathcal{F} \in \text{Hom}_A^{\text{cont}}(N^\vee, N'), Y\mathcal{F} = 0\} \\ &= \{\mathcal{F} \in \text{Hom}_A^{\text{cont}}(N^\vee, N'), X\mathcal{F}(f) = \mathcal{F}(Xf) \forall f \in N^\vee\} \\ &= \text{Hom}_{A[[X]]}^{\text{cont}}(N^\vee, N') \end{aligned}$$

est un  $A[[X]]$ -module de torsion ( $X^j$  agissant par  $X^j \otimes 1$  ou  $1 \otimes X^j$ ) stable par l'action de  $\mathbb{Z}_p^\times$  et par :

$$\left( \sum_{i=0}^{p-1} (1+X)^{p-1-i} \otimes (1+X)^i \right) F \quad (17)$$

dans  $\text{Hom}_A^{\text{cont}}(N^\vee, N')$  (il s'agit du sous- $A$ -module de  $\text{Hom}_A^{\text{cont}}(N^\vee, N')$  des homomorphismes  $A[[X]]$ -linéaires). En *définissant* l'action de  $F$  sur  $\text{Hom}_{A[[X]]}^{\text{cont}}(N^\vee, N')$  par (17), on obtient un objet de  $\text{Mod}_A$ .

**Lemme 5.3.** *Soit  $M$  et  $M'$  deux objets de  $\text{Mod}_A$  dont les  $A[[X]]$ -modules sous-jacents sont admissibles. Le dual de l'application :*

$$\text{Id} \otimes F : A[[X]] \otimes_{\varphi, A[[X]]} \text{Hom}_{A[[X]]}^{\text{cont}}(M^\vee, M') \rightarrow \text{Hom}_{A[[X]]}^{\text{cont}}(M^\vee, M')$$

*s'identifie à l'application  $(\text{Id} \otimes F_M)^\vee \otimes (\text{Id} \otimes F_{M'})^\vee$  (avec des notations évidentes) :*

$$\begin{aligned} M^\vee \otimes_{A[[X]]} M'^\vee &\rightarrow (A[[X]] \otimes_{\varphi, A[[X]]} M)^\vee \otimes_{A[[X]]} (A[[X]] \otimes_{\varphi, A[[X]]} M')^\vee \\ &\cong (A[[X]] \otimes_{\varphi, A[[X]]} M^\vee) \otimes_{A[[X]]} (A[[X]] \otimes_{\varphi, A[[X]]} M'^\vee) \\ &\cong A[[X]] \otimes_{\varphi, A[[X]]} (M^\vee \otimes_{A[[X]]} M'^\vee). \end{aligned}$$

*Démonstration.* Notons d'abord que  $\text{Hom}_{A[[X]]}^{\text{cont}}(M^\vee, M') = \text{Hom}_{A[[X]]}(M^\vee, M')$  (car  $M^\vee$  est de type fini sur  $A[[X]]$ ) et que le  $A[[X]]$ -module  $\text{Hom}_{A[[X]]}(M^\vee, M')$  est admissible (car  $\text{Hom}_{A[[X]]}(M^\vee, M')[X] = \text{Hom}_A(M^\vee/(X), M'[X])$  est de type fini sur  $A$  puisque  $M^\vee/(X)$  et  $M'[X]$  le sont). Considérons l'application entre  $A[[X]]$ -modules de type fini :

$$\begin{aligned} M^\vee \otimes_{A[[X]]} M'^\vee &\longrightarrow \text{Hom}_A(\text{Hom}_{A[[X]]}(M^\vee, M'), A) \\ f \otimes f' &\longmapsto (\mathcal{F} \mapsto f'(\mathcal{F}(f))) \end{aligned} \quad (18)$$

( $f \in M^\vee, f' \in M'^\vee, \mathcal{F} \in \text{Hom}_{A[[X]]}(M^\vee, M')$ ). Elle est bien définie et  $A[[X]]$ -linéaire car  $(S(X)f')(\mathcal{F}(f)) = f'(S(X)\mathcal{F}(f)) = f'(\mathcal{F}(S(X)f))$  ( $S(X) \in A[[X]]$ ). Il est facile de vérifier qu'elle est de plus  $\mathbb{Z}_p^\times$ -invariante. Montrons qu'il s'agit d'un isomorphisme. Par dualité, il suffit de montrer que l'application  $A[[X]]$ -linéaire induite sur les  $A[[X]]$ -modules admissibles de torsion :

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{A[[X]]}(M^\vee, M') &\rightarrow \text{Hom}_A^{\text{cont}}(M^\vee \otimes_{A[[X]]} M'^\vee, A) \\ \mathcal{F} &\mapsto (f \otimes f' \mapsto f'(\mathcal{F}(f))) \end{aligned} \quad (19)$$

est un isomorphisme. Comme on a des isomorphismes de  $A[[X]]$ -modules :

$$\text{Hom}_{A[[X]]}(M^\vee, M') \cong \varinjlim_n \text{Hom}_{A[[X]]}(M^\vee/(X^n), M'[X^n])$$

$$\text{Hom}_A^{\text{cont}}(M^\vee \otimes_{A[[X]]} M'^\vee, A) \cong \varinjlim_n \text{Hom}_A(M^\vee/(X^n) \otimes_{A[[X]]} M'^\vee/(X^n), A),$$

il suffit de montrer l'analogue de (19) en remplaçant  $M$  (resp.  $M'$ ) par  $M[X^n]$  (resp.  $M'[X^n]$ ), i.e., il suffit de le démontrer avec  $M$  et  $M'$  des  $A[[X]]$ -modules de torsion de type fini (donc finis). Changeant de notations, il suffit donc de montrer que :

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{A[[X]]}(M, M'^{\vee}) &\rightarrow \text{Hom}_A(M \otimes_{A[[X]]} M', A) \\ \mathcal{F} &\mapsto (m \otimes m' \mapsto \mathcal{F}(m)(m')) \end{aligned} \tag{20}$$

est un isomorphisme, ce qui est clair car l'application réciproque est donnée par :

$$\mathcal{G} \in \text{Hom}_A(M \otimes_{A[[X]]} M', A) \longmapsto (m \mapsto (m' \mapsto \mathcal{G}(m \otimes m'))).$$

Reste enfin à montrer que le diagramme :

$$\begin{array}{ccc} M^{\vee} \otimes_{A[[X]]} M'^{\vee} & \xrightarrow{(18)} & \text{Hom}_A(\text{Hom}_{A[[X]]}^{\text{cont}}(M^{\vee}, M'), A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ A[[X]] \otimes_{\varphi, A[[X]]} (M^{\vee} \otimes_{A[[X]]} M'^{\vee}) & \xrightarrow{\text{Id} \otimes (18)} & A[[X]] \otimes_{\varphi, A[[X]]} \text{Hom}_A(\text{Hom}_{A[[X]]}^{\text{cont}}(M^{\vee}, M'), A) \end{array} \tag{21}$$

est commutatif où les deux applications verticales sont les duales de  $\text{Id} \otimes F$ . Si  $N$  est un objet quelconque de  $\text{Mod}_A$ , l'application :

$$(\text{Id} \otimes F)^{\vee} : N^{\vee} \rightarrow (A[[X]] \otimes_{\varphi, A[[X]]} N)^{\vee} \cong A[[X]] \otimes_{\varphi, A[[X]]} N^{\vee}$$

est donnée par :

$$f \mapsto \sum_{i=0}^{p-1} (1+X)^{p-1-i} \otimes f_i \tag{22}$$

où  $f \in N^{\vee}$  et  $f_i \in N^{\vee}$  est défini par  $f_i(n) \stackrel{\text{déf}}{=} f((1+X)^i F(n))$  pour  $n \in N$ . La commutation de (21) est alors un calcul un petit peu laborieux mais sans difficulté et laissé au lecteur.  $\square$

**Proposition 5.4.** *Soit  $M$  et  $M'$  deux objets de  $\text{Mod}_A$  dont les  $A[[X]][[F]]$ -modules sous-jacents vérifient (1). Alors  $\text{Hom}_{A[[X]]}^{\text{cont}}(M^{\vee}, M')$  vérifie aussi (1).*

*Démonstration.* On a vu dans la preuve du lemme 5.3 que le  $A[[X]]$ -module  $\text{Hom}_{A[[X]]}^{\text{cont}}(M^{\vee}, M') = \text{Hom}_{A[[X]]}(M^{\vee}, M')$  est admissible. Il faut montrer qu'il est de type fini sur  $A[[X]][[F]]$ . L'application :

$$\begin{aligned} (\text{Id} \otimes F_M)^{\vee} \otimes (\text{Id} \otimes F_{M'})^{\vee} : \\ M^{\vee} \otimes_{A[[X]]} M'^{\vee} &\longrightarrow (A[[X]] \otimes_{\varphi, A[[X]]} M)^{\vee} \otimes_{A[[X]]} (A[[X]] \otimes_{\varphi, A[[X]]} M')^{\vee} \\ &\cong A[[X]] \otimes_{\varphi, A[[X]]} (M^{\vee} \otimes_{A[[X]]} M'^{\vee}) \end{aligned}$$

est un isomorphisme  $A[[X]][[1/X]]$ -linéaire lorsque l'on inverse  $X$  car tel est le cas de  $(\text{Id} \otimes F_M)^{\vee}$  et  $(\text{Id} \otimes F_{M'})^{\vee}$  (puisque  $M, M'$  vérifient (1), cf. (3)). Le lemme 5.2

(que l'on peut appliquer à  $\text{Hom}_{A[[X]]}(M^\vee, M')$  par le [lemme 5.3](#)) implique alors que  $\widehat{\text{Hom}}_{A[[X]]}(M^\vee, M')$  est de type fini sur  $A[[X]][F]$ .  $\square$

La catégorie  $\widehat{\Phi}\Gamma_A^{\text{ét}}$  est munie d'un produit tensoriel naturel comme suit : si  $D = \varprojlim_{i \in I} D_i$  et  $D' = \varprojlim_{i' \in I'} D'_{i'}$  sont dans  $\widehat{\Phi}\Gamma_A^{\text{ét}}$ , on pose :

$$D \widehat{\otimes} D' \stackrel{\text{déf}}{=} \varprojlim_{(i, i') \in I \times I'} (D_i \otimes_{A[[X]][1/X]} D'_{i'}) \in \widehat{\Phi}\Gamma_A^{\text{ét}} \quad (23)$$

où  $D_i \otimes_{A[[X]][1/X]} D'_{i'}$  est le produit tensoriel dans  $\Phi\Gamma_A^{\text{ét}}$  (on vérifie que cela est indépendant des  $D_i, D'_{i'}$ , tels que  $D = \varprojlim D_i$  et  $D' = \varprojlim D'_{i'}$ ). Notons que  $D \widehat{\otimes} D' = D \otimes_{A[[X]][1/X]} D'$  si  $D, D' \in \Phi\Gamma_A^{\text{ét}}$ .

Nous montrons maintenant le résultat principal de cette section. Notons d'abord que, comme le foncteur  $D_\xi^\vee$  du § 3 ne dépend que du choix de  $\xi$ , quitte à modifier  $\iota_\alpha$  et  $N_0$  il n'est pas difficile de voir que l'on peut de plus supposer que  $\iota_\alpha$  induit des isomorphismes pour  $\alpha \in S$  :

$$N_\alpha(L) \cap N_0 \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_L \subset L = \mathbb{G}_a(L). \quad (24)$$

On supposera toujours dans la suite que  $N_0$  vérifie (24). De plus, on fixe une fois pour toute un isomorphisme de  $\mathbb{Z}_p$ -modules  $\psi : \text{Tr}_{L/\mathbb{Q}_p}(\mathcal{O}_L) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_p$ , ce qui fixe donc un isomorphisme (si  $G \neq T$ ) :

$$N_0/N_1 \xrightarrow[\text{Tr}_{L/\mathbb{Q}_p} \circ \ell]{\sim} \text{Tr}_{L/\mathbb{Q}_p}(\mathcal{O}_L) \xrightarrow[\psi]{\sim} \mathbb{Z}_p.$$

Soit  $G'$  un autre groupe algébrique réductif connexe déployé sur  $L$  de centre connexe,  $B' \subseteq G'$  un sous-groupe de Borel et  $T' \subseteq B'$  un tore maximal déployé dans  $B'$ . Comme pour  $(G, B, T)$  on fixe  $(\iota_{\alpha'})_{\alpha' \in S'}$  (où  $S'$  désigne les racines simples associées à  $(G', B', T')$ ),  $\xi' \in X^\vee(T')$  et  $N'_0$  totalement décomposé vérifiant (24). On définit  $N'_1$  par (11) et, comme ci-dessus, l'isomorphisme  $\psi$  induit un isomorphisme de  $\mathbb{Z}_p$ -modules  $N'_0/N'_1 \cong \mathbb{Z}_p$  si  $G' \neq T'$ . On considère  $(G \times G', B \times B', T \times T')$  avec les choix  $((\iota_\alpha)_{\alpha \in S}, (\iota_{\alpha'})_{\alpha' \in S'})$ ,  $\xi \oplus \xi' \in X^\vee(T \times T')$  et  $N_0 \times N'_0$  (qui est totalement décomposé et vérifie (24)) et on note :

$$N''_1 \stackrel{\text{déf}}{=} \text{Ker}(N_0 \times N'_0 \xrightarrow{\sum \iota_\alpha + \sum \iota_{\alpha'}} \mathcal{O}_L \xrightarrow{\text{Tr}_{L/\mathbb{Q}_p}} \text{Tr}_{L/\mathbb{Q}_p}(\mathcal{O}_L) \xrightarrow{\psi} \mathbb{Z}_p). \quad (25)$$

Pour toute représentation lisse de  $B(L) \times B'(L)$  sur  $A$  on dispose donc de  $D_{\xi \oplus \xi'}^\vee(\cdot) \in \widehat{\Phi}\Gamma_A^{\text{ét}}$ .

**Proposition 5.5.** *Soit  $\pi$  et  $\pi'$  des représentations lisses respectivement de  $B(L)$  et  $B'(L)$  sur des  $A$ -modules libres. On suppose que les  $A[[X]][F]$ -modules  $\pi^{N_1}$  et  $\pi'^{N'_1}$  satisfont la propriété Ad de la [définition 2.2](#). Alors on a un isomorphisme dans  $\widehat{\Phi}\Gamma_A^{\text{ét}}$  :*

$$D_{\xi \oplus \xi'}^\vee(\pi \otimes_A \pi') \cong D_\xi^\vee(\pi) \widehat{\otimes} D_{\xi'}^\vee(\pi'). \quad (26)$$

*Démonstration.* Notons  $\text{Hom}_A^{\text{cont}}(\pi^\vee, \pi')$  le  $A$ -module des homomorphismes  $A$ -linéaires continus de  $\pi^\vee$  dans  $\pi'$  où  $\pi^\vee$  est muni de la topologie profinie et  $\pi'$  de la topologie discrète. En écrivant  $\pi = \varinjlim_n V_n$  et  $\pi' = \varinjlim_{n'} V_{n'}$ , où  $V_n$  et  $V_{n'}$  sont des sous- $A$ -modules *libres* de type fini quelconques de (l'espace sous-jacent à) respectivement  $\pi$  et  $\pi'$ , on a :

$$\text{Hom}_A^{\text{cont}}(\pi^\vee, \pi') = \varinjlim_n \text{Hom}_A(V_n^\vee, \pi') = \varinjlim_{n, n'} \text{Hom}_A(V_n^\vee, V_{n'}). \quad (27)$$

L'application  $\pi \otimes_A \pi' \rightarrow \text{Hom}_A^{\text{cont}}(\pi^\vee, \pi')$ ,  $v \otimes v' \mapsto (f \mapsto f(v)v')$  est un isomorphisme, car par (27) et  $\pi \otimes_A \pi' = \varinjlim_{n, n'} V_n \otimes_A V_{n'}$  il suffit de le vérifier avec les  $A$ -modules libres de type fini  $V_n$  et  $V_{n'}$  au lieu de  $\pi$  et  $\pi'$  où c'est évident.

Supposons d'abord  $G \neq T$  et  $G' \neq T'$ . On déduit de ce qui précède un isomorphisme :

$$\begin{aligned} (\pi \otimes_A \pi')^{N_1 \times N'_1} &\xrightarrow{\sim} \text{Hom}_A^{\text{cont}}(\pi^\vee, \pi')^{N_1 \times N'_1} \cong \text{Hom}_A^{\text{cont}}(\pi^\vee, \pi'^{N'_1})^{N_1} \\ &\cong \text{Hom}_A^{\text{cont}}((\pi^{N_1})^\vee, \pi'^{N'_1}). \end{aligned} \quad (28)$$

(Le dernier isomorphisme se montre en écrivant  $\pi = \varinjlim_n W_n$  où la limite inductive est prise sur des sous- $A$ -modules de type finis  $W_n$  de  $\pi$  stables par  $N_1$  et en utilisant que les coinvariants  $(W_n^\vee)_{N_1}$  de  $W_n^\vee$  pour l'action de  $N_1$  sont isomorphes à  $(W_n^{N_1})^\vee$ , ce qui découle en dualisant puis en remplaçant  $W_n$  par son dual du fait que, si  $V$  est une représentation lisse de  $N_1$  sur un  $A$ -module de type fini, on a  $(V^\vee)^{N_1} = (V_{N_1})^\vee$ .) Il n'est pas difficile de vérifier que l'action de  $N_0 \times N'_0$  sur  $(\pi \otimes_A \pi')^{N_1 \times N'_1}$  induit la structure de  $A[[N_0/N_1]] \otimes_A A[[N'_0/N'_1]] \cong A[[N'_0/N'_1]] \otimes_A A[[N_0/N_1]] \cong A[[X]] \otimes_A A[[X]]$ -module définie ci-dessus sur  $\text{Hom}_A^{\text{cont}}((\pi^{N_1})^\vee, \pi'^{N'_1})$  (rappelons que  $\pi^{N_1}$  et  $\pi'^{N'_1}$  sont dans  $\text{Mod}_A$ ) et que, par (25), cela induit un isomorphisme de  $A[[X]]$ -modules :

$$(\pi \otimes_A \pi')^{N'_1} \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_A^{\text{cont}}((\pi^{N_1})^\vee, \pi'^{N'_1})[Y] \cong \text{Hom}_{A[[X]]}^{\text{cont}}((\pi^{N_1})^\vee, \pi'^{N'_1}) \quad (29)$$

qui commute aux actions de  $\mathbb{Z}_p^\times$  et de  $F$  (avec l'action (17) de  $F$  à droite). Soit  $H \subseteq \text{Hom}_{A[[X]]}^{\text{cont}}((\pi^{N_1})^\vee, \pi'^{N'_1})$  un sous- $A[[X]][F]$ -module de type fini et  $\mathcal{F}_1, \dots, \mathcal{F}_d$  des générateurs de  $H$  sur  $A[[X]][F]$ . Par continuité chaque  $\mathcal{F}_i : (\pi^{N_1})^\vee \rightarrow \pi'^{N'_1}$  se factorise par un quotient  $M_i^\vee$  de  $(\pi^{N_1})^\vee$  où  $M_i \subseteq \pi^{N_1}$  est un sous- $A$ -module de type fini que l'on peut prendre stable par  $\mathbb{Z}_p^\times$ , et est à valeurs dans un sous- $A$ -module de type fini  $M'_i$  (stable par  $\mathbb{Z}_p^\times$ ) de  $\pi'^{N'_1}$ . Soit  $M$  (resp.  $M'$ ) le sous- $A[[X]][F]$ -module de  $\pi^{N_1}$  (resp.  $\pi'^{N'_1}$ ) engendré par  $\sum_{i=1}^d M_i$  (resp.  $\sum_{i=1}^d M'_i$ ), alors  $M$  et  $M'$  sont des  $A[[X]][F]$ -modules de type fini (stables par  $\mathbb{Z}_p^\times$ ) et donc des  $A[[X]]$ -modules admissibles puisque  $\pi^{N_1}$  et  $\pi'^{N'_1}$  satisfont la propriété Ad. De plus, par construction on a :

$$\mathcal{F}_i \in \text{Hom}_{A[[X]]}^{\text{cont}}(M^\vee, M') = \text{Hom}_{A[[X]]}(M^\vee, M')$$

pour tout  $i$  et donc  $H = \sum_{i=1}^d A[[X]][F]\mathcal{F}_i \subseteq \text{Hom}_{A[[X]]}(M^\vee, M')$ . Comme par la proposition 5.4 et (29), on a :

$$\text{Hom}_{A[[X]]}(M^\vee, M') \in \mathcal{M}(\text{Hom}_{A[[X]]}^{\text{cont}}((\pi^{N_1})^\vee, \pi'^{N'_1})) = \mathcal{M}((\pi \otimes_A \pi')^{N''_1}),$$

on en déduit que  $H$  est un  $A[[X]]$ -module admissible et que les  $A[[X]][F]$ -modules  $\text{Hom}_{A[[X]]}(M^\vee, M')$  pour  $(M, M')$  parcourant  $\mathcal{M}(\pi^{N_1}) \times \mathcal{M}(\pi'^{N'_1})$  forment un système cofinal dans  $\mathcal{M}((\pi \otimes_A \pi')^{N''_1})$ . Cela implique :

$$\begin{aligned} D^\vee((\pi \otimes_A \pi')^{N''_1}) &\cong \varprojlim_{(M, M')} D^\vee(\text{Hom}_{A[[X]]}(M^\vee, M')) \\ &\cong \varprojlim_{(M, M')} (M^\vee[1/X] \otimes_{A[[X]][1/X]} M'^\vee[1/X]) \\ &\cong D^\vee(\pi^{N_1}) \widehat{\otimes} D^\vee(\pi'^{N'_1}), \end{aligned}$$

où la limite projective est prise sur  $(M, M') \in \mathcal{M}(\pi^{N_1}) \times \mathcal{M}(\pi'^{N'_1})$  et où le deuxième isomorphisme résulte du lemme 5.3. Cela donne l’isomorphisme de l’énoncé lorsque  $G \neq T, G' \neq T'$ .

Traisons le cas  $G = T$  et  $G' \neq T'$  et notons que  $\pi^{N_1} = \pi$  est un  $A[F]$ -module de torsion puisqu’il satisfait la propriété Ad. Pour  $(M, M') \in \mathcal{M}(\pi) \times \mathcal{M}(\pi'^{N'_1})$  on a  $\text{Hom}_A^{\text{cont}}(M^\vee, M') = \text{Hom}_A(M^\vee, M')$  et un isomorphisme  $A[[X]]$ -linéaire analogue à (18) :

$$(A[[X]] \otimes_A M^\vee) \otimes_{A[[X]]} M'^\vee \cong M^\vee \otimes_A M'^\vee \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_A(\text{Hom}_A(M^\vee, M'), A).$$

Par une preuve analogue (en plus simple) à celle du cas  $G \neq T, G' \neq T'$ , on obtient que les  $\text{Hom}_A(M^\vee, M')$  pour  $(M, M') \in \mathcal{M}(\pi) \times \mathcal{M}(\pi'^{N'_1})$  forment un système cofinal dans  $\mathcal{M}(\text{Hom}_A^{\text{cont}}(\pi^\vee, \pi'^{N'_1})) = \mathcal{M}(\pi \otimes_A \pi'^{N_1})$  et que  $D^\vee(\text{Hom}_A(M^\vee, M')) \cong D^\vee(M) \otimes_{A[[X]][1/X]} D^\vee(M')$ . On conclut comme dans le cas  $G \neq T, G' \neq T'$ . Enfin, le cas  $G = T, G' = T'$  est encore plus simple et laissé au lecteur.  $\square$

**Remarque 5.6.** (i) La preuve de la proposition 5.5 donne aussi que le  $A[[X]][F]$ -module  $(\pi \otimes_A \pi')^{N''_1} \cong \text{Hom}_{A[[X]]}^{\text{cont}}((\pi^{N_1})^\vee, \pi'^{N'_1})$  satisfait la propriété Ad. Par une récurrence immédiate, on en déduit pour tout entier  $n > 0$  un isomorphisme (avec des notations évidentes)  $D_{\xi_1 \oplus \dots \oplus \xi_n}^\vee(\pi_1 \otimes_A \dots \otimes_A \pi_n) \cong D_{\xi_1}^\vee(\pi_1) \widehat{\otimes} \dots \widehat{\otimes} D_{\xi_n}^\vee(\pi_n)$  lorsque tous les  $\pi_i$  vérifient les hypothèses de la proposition 5.5.

(ii) L’énoncé de la proposition 5.5 est peut-être valable sans supposer que  $\pi^{N_1}$  et  $\pi'^{N'_1}$  satisfont la propriété Ad ou que les espaces sous-jacents à  $\pi$  et  $\pi'$  sont libres sur  $A$ . Par exemple, on peut montrer que, lorsque  $A = k_E$ , l’isomorphisme (26) est vrai pour toutes représentations lisses  $\pi, \pi'$  de  $B(L)$  et  $B'(L)$  sur  $k_E$  sans hypothèse supplémentaire. Mais n’ayant qu’une preuve assez laborieuse de ce dernier résultat (pour  $A = k_E$ ), et n’ayant de toute façon pas à appliquer (26) ici en dehors des

conditions de la [proposition 5.5](#) (cf. §9), j’ai finalement opté pour l’énoncé *a minima* ci-dessus.

(iii) Soit  $N$  dans  $\text{Mod}_A$  et munissons  $N^\vee = \text{Hom}_A(N, A)$  de sa structure de  $A[[X]][F]$ -module avec action de  $\mathbb{Z}_p^\times$  comme ci-dessus. Alors tout quotient  $D$  de  $N^\vee[1/X]$  de type fini comme  $A[[X]][1/X]$ -module, stable par  $\mathbb{Z}_p^\times$  et tel que  $(\text{Id} \otimes F)^\vee : N^\vee[1/X] \rightarrow A[[X]] \otimes_{\varphi, A[[X]]} N^\vee[1/X]$  induit un isomorphisme  $D \xrightarrow{\sim} A[[X]] \otimes_{\varphi, A[[X]]} D$  est de la forme  $M^\vee[1/X]$  pour un  $M \in \mathcal{M}(N)$ . En effet, il suffit de considérer l’image du  $A[[X]]$ -module compact  $N^\vee$  dans le  $A[[X]][1/X]$ -module de type fini  $D$ , d’utiliser la dualité modules compacts - modules discrets [[Gabriel 1962](#), §IV.4] et d’appliquer le [lemme 5.2](#) au dual  $M$  de cette image. Comme réciproquement tout  $M \in \mathcal{M}(N)$  donne un tel quotient  $D = M^\vee[1/X]$  ([lemme 2.6](#)), on obtient que  $D^\vee(N)$  s’identifie à la limite projective des quotients de  $N^\vee[1/X]$  qui sont dans  $\Phi\Gamma_A^{\text{ét}}$ . En appliquant cela à  $N = \pi^{N_1}$  pour  $\pi$  représentation lisse de  $B(L)$  sur  $A$  (et  $G \neq T$ ), on voit que  $D_\xi^\vee(\pi)$  s’identifie à la limite projective des  $A[[X]][1/X]$ -modules quotients de  $(\pi^{N_1})^\vee[1/X]$  qui sont dans  $\Phi\Gamma_A^{\text{ét}}$ . On a une identification analogue lorsque  $G = T$  en remplaçant  $(\pi^{N_1})^\vee[1/X]$  par  $\pi^\vee \otimes_A A[[X]][1/X]$  que l’on laisse au lecteur.

(iv) On peut donner une variante comme suit de la preuve du [lemme 5.2](#) (je remercie un rapporteur anonyme pour cette remarque). Via le même argument qu’au début du (iii) ci-dessus et une récurrence comme au début de la preuve du [lemme 5.2](#), on peut supposer que  $M^\vee[1/X]$  est un  $\varphi$ -module (étale) irréductible sur  $k_E[[X]][1/X]$  (on utilise que la catégorie des  $\varphi$ -modules étales de dimension finie est abélienne, noter qu’il n’y a pas de  $\Gamma$  ici). Dès lors (avec les notations de la preuve du [lemme 5.2](#)) : soit  $M = M_n$  pour un  $n > 0$ , et c’est fini puisque  $M_n$  est de type fini sur  $k_E[[X]][F]$ , soit  $M_n^\vee[1/X] = 0$  pour tout  $n > 0$  par irréductibilité de  $M$ , ce qui conduit à l’existence de  $M'$  et une contradiction.

(v) La construction de  $D_\xi^\vee(\pi)$  donnée en (iii) ci-dessus peut aussi s’interpréter comme une propriété universelle de  $D_\xi^\vee(\pi)$ . Nous renvoyons pour cela le lecteur à l’article récent d’Erdélyi et Zábrádi [[2014](#)] où les auteurs utilisent [[Zábrádi 2011](#)] pour généraliser cette interprétation de  $D_\xi^\vee(\pi)$  et faire le lien avec le foncteur construit dans [[Schneider et Vignéras 2011](#)].

### 6. Le cas des induites paraboliques I

Dans cette section et la suivante on calcule le  $D_\xi^\vee$  d’une induite parabolique en fonction du  $D_\xi^\vee$  de la représentation induisante du Levi.

On conserve les notations du § 3, en particulier on fixe des isomorphismes  $\iota_\alpha : N_\alpha \xrightarrow{\sim} \mathbb{G}_a$  pour  $\alpha \in S$  vérifiant (9), un sous-groupe ouvert compact  $N_0 \subset N(L)$  totalement décomposé et vérifiant (24), un isomorphisme de  $\mathbb{Z}_p$ -modules

$\psi : \text{Tr}_{L/\mathbb{Q}_p}(\mathcal{O}_L) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_p$  (ce qui détermine un isomorphisme  $N_0/N_1 \cong \mathbb{Z}_p$  lorsque  $G \neq T$ ) et un cocaractère  $\xi \in X^\vee(T)$  tel que  $\alpha \circ \xi = \text{Id}_{\mathbb{G}_m}$  pour  $\alpha \in S$ .

Soit  $P \subseteq G$  un sous-groupe parabolique contenant  $B$ ,  $L_P$  son sous-groupe de Levi,  $N_P$  son radical unipotent,  $P^-$  le parabolique opposé à  $P$  et  $N_{P^-}$  le radical unipotent de  $P^-$ . Le groupe  $L_P$  est réductif connexe déployé et on fixe  $B \cap L_P$  comme sous-groupe de Borel de  $L_P$ , dont le radical unipotent est  $N_{L_P} = N \cap L_P$ . On note  $R_P$  les racines de  $(L_P, T)$ ,  $R_P^+ \subseteq R_P$  les racines positives relativement à  $B \cap L_P$  et  $S_P \subseteq R_P^+$  les racines simples. Comme  $Z_G$  est connexe par hypothèse, ou de manière équivalente le  $\mathbb{Z}$ -module  $X(T)/(\oplus_{\alpha \in S} \mathbb{Z}\alpha)$  est sans torsion, on a que le centre  $Z_{L_P}$  de  $L_P$  est aussi connexe (car  $X(T)/(\oplus_{\alpha \in S_P} \mathbb{Z}\alpha)$  est aussi sans torsion puisque  $X(T)/(\oplus_{\alpha \in S} \mathbb{Z}\alpha)$  est sans torsion et  $\oplus_{\alpha \in S_P} \mathbb{Z}\alpha$  est facteur direct de  $\oplus_{\alpha \in S} \mathbb{Z}\alpha$ ).

Pour pouvoir appliquer à  $(L_P, B \cap L_P, T)$  les constructions et résultats du §3 on doit fixer des choix pour le groupe réductif  $L_P$ . On le fait de manière compatible à ceux pour  $G$  comme suit. On garde le même  $\xi \in X^\vee(T)$  et les mêmes  $\iota_\alpha$  (pour  $\alpha \in S_P$ ) et on note  $\ell_P$  la composée :

$$N_{L_P} \rightarrow \prod_{\alpha \in S_P} N_\alpha \xrightarrow{\sum_{\alpha \in S_P} \iota_\alpha} \mathbb{G}_a.$$

On a donc un diagramme commutatif :

$$\begin{array}{ccc} N_{L_P} & \hookrightarrow & N \\ \ell_P \downarrow & & \downarrow \ell \\ \mathbb{G}_a & \xlongequal{\quad} & \mathbb{G}_a \end{array} \tag{30}$$

On pose  $N_{L_P,0} \stackrel{\text{déf}}{=} N_{L_P}(L) \cap N_0 = \prod_{\alpha \in R_P^+} N_\alpha(L) \cap N_0$  de sorte que :

$$N_{L_P,1} \stackrel{\text{déf}}{=} \text{Ker}(N_{L_P,0} \xrightarrow{\ell_P} L \xrightarrow{\text{Tr}_{L/\mathbb{Q}_p}} \mathbb{Q}_p)$$

vérifie  $N_{L_P,1} = N_{L_P}(L) \cap N_1 = N_{L_P,0} \cap N_1$  par (30). Lorsque  $P \neq B$ , l'hypothèse (24) implique que l'on a des suites exactes courtes :

$$0 \rightarrow N_{L_P,1} \rightarrow N_{L_P,0} \rightarrow \text{Tr}_{L/\mathbb{Q}_p}(\mathcal{O}_L) \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow N_1 \rightarrow N_0 \rightarrow \text{Tr}_{L/\mathbb{Q}_p}(\mathcal{O}_L) \rightarrow 0$$

d'où il suit que l'injection  $N_{L_P,0} \subseteq N_0$  induit un isomorphisme (pour  $P \neq B$ ) :

$$N_{L_P,0}/N_{L_P,1} \xrightarrow{\sim} N_0/N_1. \tag{31}$$

Toujours lorsque  $P \neq B$ , l'isomorphisme  $\psi$  induit  $N_{L_P,0}/N_{L_P,1} \cong \mathbb{Z}_p$  qui coïncide avec (31) composé avec  $N_0/N_1 \cong \mathbb{Z}_p$ .

L'objectif de cette section et la suivante est de démontrer le théorème suivant.

**Théorème 6.1.** Soit  $\pi_P$  une représentation lisse de  $L_P(L)$  sur  $A$ , que l'on voit par inflation comme représentation lisse de  $P^-(L)$ . On a un isomorphisme fonctoriel en  $\pi_P$  dans la catégorie  $\widehat{\Phi\Gamma}_A^{\text{ét}}$  :

$$D_\xi^\vee(\text{Ind}_{P^-(L)}^{G(L)} \pi_P) \cong D_\xi^\vee(\pi_P).$$

On suppose  $G \neq T$  dans la suite sinon il n'y a rien à montrer. On note  $W \cong N_G(T)/T$  et  $W_P \cong N_{L_P}(T)/T$  les groupes de Weyl respectifs de  $G$  et  $L_P$ , et  $w_0 \in W$  l'élément de longueur maximale. On a  $W_P \subseteq W$  et l'ensemble :

$$K_P \stackrel{\text{déf}}{=} \{w \in W, w^{-1}(R_P^+) \subseteq R^+\}$$

est un système de représentants (dits de Kostant) des classes à gauche  $W_P \backslash W$ . En utilisant que  $\{ww_0, w \in K_P\}$  est encore un système de représentants de  $W_P \backslash W$ , on déduit de la décomposition de Bruhat généralisée [Digne et Michel 1991, Lemma 5.5] que l'on a une décomposition :

$$G = \coprod_{w \in K_P} P^-wB = \coprod_{w \in K_P} P^-wN. \tag{32}$$

En procédant comme dans [Emerton 2010, §4.3] ou [Vignéras 2008] ou encore [Hauseux 2014, §2.1], rappelons que la représentation  $\text{Ind}_{P^-(L)}^{G(L)} \pi_P$  admet une filtration croissante par des sous- $B(L)$ -représentations dont les gradués sont contenus dans :

$$\mathcal{C}_w(\pi_P) \stackrel{\text{déf}}{=} \text{c-Ind}_{P^-(L)}^{P^-(L)wN(L)} \pi_P$$

pour  $w \in K_P$  où c-Ind signifie les fonctions (localement constantes) à support compact modulo  $P^-(L)$  et où l'action de  $B(L)$  sur  $\mathcal{C}_w(\pi_P)$  est la translation à droite sur les fonctions. De plus  $\mathcal{C}_1(\pi_P)$  est le premier cran (ou premier gradué) de la filtration. En fait, au moins lorsque  $P = B$ , les gradués sont tous exactement les  $\mathcal{C}_w(\pi_P)$ , cf. par exemple [Hauseux 2014, §2.1] (nous n'aurons pas besoin de ce résultat pour  $P \neq B$ ). Par exactitude à droite du foncteur contravariant  $D_\xi^\vee$  (cf. (ii) de la proposition 3.2) et un dévissage évident, on voit qu'il suffit de démontrer les deux propositions suivantes.

**Proposition 6.2.** On a  $D_\xi^\vee(\mathcal{C}_w(\pi_P)) = 0$  pour tout  $w \in K_P \setminus \{1\}$ .

**Proposition 6.3.** On a un isomorphisme fonctoriel en  $\pi_P$  dans la catégorie  $\widehat{\Phi\Gamma}_A^{\text{ét}}$  :

$$D_\xi^\vee(\mathcal{C}_1(\pi_P)) \cong D_\xi^\vee(\pi_P).$$

Pour  $w \in K_P$  soit  $\pi_P^w$  la représentation de  $w^{-1}P^-(L)w$  dont l'espace sous-jacent est le même que  $\pi_P$  et telle que  $w^{-1}p^-w \in w^{-1}P^-(L)w$  agit par  $\pi_P(p^-)$ . On a un isomorphisme  $B(L)$ -équivariant :

$$\mathcal{C}_w(\pi_P) \xrightarrow{\sim} \text{c-Ind}_{w^{-1}P^-(L)w \cap N(L)}^{N(L)} \pi_P^w, \quad f \mapsto (n \mapsto f(wn)) \tag{33}$$

où l'action de  $N(L)$  est la translation à droite sur les fonctions et où l'action de  $T(L)$  est donnée par :

$$(th)(n) = \pi_P^w(t)(h(t^{-1}nt)) \tag{34}$$

si  $t \in T(L)$ ,  $n \in N(L)$  et  $h \in \mathbf{c}\text{-Ind}_{w^{-1}P^-(L)w \cap N(L)}^{N(L)} \pi_P^w$  (noter que  $T(L)$  est contenu dans  $w^{-1}P^-(L)w$ ).

Le reste de cette section est consacré à la démonstration de la [proposition 6.2](#).

**Lemme 6.4.** *Notons  $R^-$  (resp.  $R_P^-$ ) les racines négatives de  $(G, T)$  (resp.  $(L_P, T)$ ) relativement à  $B$  (resp.  $B \cap L_P$ ). Soit  $w \in K_P \setminus \{1\}$ , alors on a  $w^{-1}(R^- \setminus R_P^-) \cap S \neq \emptyset$ .*

*Démonstration.* Comme  $w \neq 1$ , on a  $R^- \cap w(R^+) \neq \emptyset$  et donc  $R^- \cap w(S) \neq \emptyset$  (puisque une racine de  $w(R^+)$  est somme à coefficients positifs de racines de  $w(S)$ ). Comme  $w \in K_P$ , on a  $w^{-1}(R_P^-) \subseteq R^-$ , donc  $w^{-1}(R_P^-) \cap S = \emptyset$  c'est-à-dire  $R_P^- \cap w(S) = \emptyset$ . On en déduit  $(R^- \setminus R_P^-) \cap w(S) \neq \emptyset$ , d'où le résultat.  $\square$

Le lemme suivant s'inspire de [[Schneider et Vignéras 2011](#), Proposition 12.2].

**Lemme 6.5.** *Soit  $w \in K_P \setminus \{1\}$ , alors  $(w^{-1}N_{P^-}(L)w \cap N_0) \setminus N_0/N_1 = \{1\}$ .*

*Démonstration.* Par le [lemme 6.4](#), il existe  $\alpha \in S$  tel que  $N_\alpha \subseteq w^{-1}N_{P^-}w$ , donc  $N_\alpha(L) \cap N_0 \subseteq w^{-1}N_{P^-}(L)w \cap N_0$  et il suffit de montrer  $(N_\alpha(L) \cap N_0) \setminus N_0/N_1 = \{1\}$ . Soit  $N_2 \stackrel{\text{déf}}{=} \text{Ker}(N_0 \xrightarrow{\ell} \mathcal{O}_L)$ , on a  $N_2 \subseteq N_1$  et il suffit de montrer que :

$$(N_\alpha(L) \cap N_0) \setminus N_0/N_2 = \{1\}.$$

Comme  $\ell : N_0/N_2 \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_L$  par (24), il suffit de montrer  $\ell(N_\alpha(L) \cap N_0) \setminus \mathcal{O}_L = \{0\}$ . Mais c'est clair puisque  $\ell(N_\alpha(L) \cap N_0) = \iota_\alpha(N_\alpha(L) \cap N_0) = \mathcal{O}_L$  (encore) par (24).  $\square$

Pour tout  $w \in K_P$  on munit  $\mathcal{C}_w(\pi_P)^{N_1} \cong (\mathbf{c}\text{-Ind}_{w^{-1}P^-(L)w \cap N(L)}^{N(L)} \pi_P^w)^{N_1}$  de sa structure d'objet de  $\text{Mod}_A$  définie au §3.

**Lemme 6.6.** (i) *Soit  $M \subseteq (\mathbf{c}\text{-Ind}_{w^{-1}P^-(L)w \cap N(L)}^{N(L)} \pi_P^w)^{N_1}$  un sous- $A[[X]][F]$ -module de type fini. Alors il existe un entier  $n \geq 0$  tel que  $F^n(M) \subseteq (\text{Ind}_{w^{-1}P^-(L)w \cap N_0}^{N_0} \pi_P^w)^{N_1}$ .*

(ii) *Le sous- $A[[X]]$ -module  $(\text{Ind}_{w^{-1}P^-(L)w \cap N_0}^{N_0} \pi_P^w)^{N_1}$  de  $(\mathbf{c}\text{-Ind}_{w^{-1}P^-(L)w \cap N(L)}^{N(L)} \pi_P^w)^{N_1}$  est un sous-objet dans  $\text{Mod}_A$ .*

*Démonstration.* (i) Par [[Hauseux 2014](#), lemme 3.1.3] on a :

$$N(L) = \bigcup_{n \geq 0} \xi(p^{-n})N_0\xi(p^n)$$

et par (34) on a :

$$\xi(p)(\text{Ind}_{w^{-1}P^-(L)w \cap \xi(p^{-n})N_0\xi(p^n)}^{\xi(p^{-n})N_0\xi(p^n)} \pi_P^w) \subseteq \text{Ind}_{w^{-1}P^-(L)w \cap \xi(p^{-n+1})N_0\xi(p^{n-1})}^{\xi(p^{-n+1})N_0\xi(p^{n-1})} \pi_P^w.$$

Soit  $n \geq 0$  et  $M_n \stackrel{\text{déf}}{=} (\text{Ind}_{w^{-1}P^-(L)w \cap \xi(p^{-n})N_0 \xi(p^n)}^{\xi(p^{-n})N_0 \xi(p^n)} \pi_P^w)^{N_1}$ , on en déduit avec (12) (et  $N_0 \subseteq \xi(p^{-n})N_0 \xi(p^n)$ ) que les  $M_n$  sont des sous- $A[[X]][F]$ -modules croissants (quand  $n$  grandit) du  $A[[X]][F]$ -module  $(\text{c-Ind}_{w^{-1}P^-(L)w \cap N(L)}^{N(L)} \pi_P^w)^{N_1}$ , que  $F(M_n) \subseteq M_{n-1}$  si  $n > 0$ , et que :

$$(\text{c-Ind}_{w^{-1}P^-(L)w \cap N(L)}^{N(L)} \pi_P^w)^{N_1} = \bigcup_{n \geq 0} M_n.$$

Si  $M \subseteq (\text{c-Ind}_{w^{-1}P^-(L)w \cap N(L)}^{N(L)} \pi_P^w)^{N_1}$  est de type fini sur  $A[[X]][F]$ , il existe donc un entier  $n \geq 0$  tel que  $M \subseteq M_n$  d'où on déduit  $F^n(M) \subseteq F^n(M_n) \subseteq M_0$ .

(ii) Par le preuve du (i),  $M_0 = (\text{Ind}_{w^{-1}P^-(L)w \cap N_0}^{N_0} \pi_P^w)^{N_1}$  est stable par  $F$  dans  $(\text{c-Ind}_{w^{-1}P^-(L)w \cap N(L)}^{N(L)} \pi_P^w)^{N_1}$ . Comme  $M_0$  est clairement stable par  $\mathbb{Z}_p^\times$  (cf. (34)), c'est donc un sous-objet dans  $\text{Mod}_A$ .  $\square$

**Proposition 6.7.** *Pour tout  $w \in K_P$ , on a un isomorphisme dans  $\widehat{\Phi\Gamma}_A^{\text{ét}}$  :*

$$D_\xi^\vee(\text{c-Ind}_{w^{-1}P^-(L)w \cap N(L)}^{N(L)} \pi_P^w) \xrightarrow{\sim} D^\vee((\text{Ind}_{w^{-1}P^-(L)w \cap N_0}^{N_0} \pi_P^w)^{N_1}).$$

*Démonstration.* Le (i) du lemme 6.6 montre que :

$$\mathcal{C}_w(\pi_P)^{N_1} / (\text{Ind}_{w^{-1}P^-(L)w \cap N_0}^{N_0} \pi_P^w)^{N_1}$$

est un  $A[F]$ -module de torsion. Le résultat découle donc de la proposition 2.7.  $\square$

On démontre maintenant la proposition 6.2. Par la proposition 6.7, il suffit de montrer que tout sous- $A[[X]][F]$ -module  $M$  de  $(\text{Ind}_{w^{-1}P^-(L)w \cap N_0}^{N_0} \pi_P^w)^{N_1}$  vérifiant les conditions (1) est tel que  $M^\vee[1/X] = 0$  si  $w \neq 1$ . Comme  $w^{-1}N_{P^-(L)}w$  agit trivialement sur  $\pi_P^w$ , on a une injection  $N_0$ -équivariante (qui n'est pas un isomorphisme si  $P \neq B$ ) :

$$\text{Ind}_{w^{-1}P^-(L)w \cap N_0}^{N_0} \pi_P^w \hookrightarrow \mathcal{C}((w^{-1}N_{P^-(L)}w \cap N_0) \setminus N_0, \pi_P^w) \tag{35}$$

où le terme de droite désigne le  $A$ -module des fonctions localement constantes avec action de  $N_0$  par translation à droite (et triviale sur  $\pi_P^w$ ). Cette injection en induit une de  $A[[X]]$ -modules :

$$\begin{aligned} (\text{Ind}_{w^{-1}P^-(L)w \cap N_0}^{N_0} \pi_P^w)^{N_1} &\hookrightarrow \mathcal{C}((w^{-1}N_{P^-(L)}w \cap N_0) \setminus N_0, \pi_P^w)^{N_1} \\ &\cong \mathcal{C}((w^{-1}N_{P^-(L)}w \cap N_0) \setminus N_0 / N_1, \pi_P^w). \end{aligned}$$

Or, si  $w \neq 1$ , le lemme 6.5 implique que  $X$  agit par 0 sur ce dernier terme, donc aussi sur  $(\text{Ind}_{w^{-1}P^-(L)w \cap N_0}^{N_0} \pi_P^w)^{N_1}$ , donc *a fortiori* sur tout  $M \subseteq (\text{Ind}_{w^{-1}P^-(L)w \cap N_0}^{N_0} \pi_P^w)^{N_1}$  vérifiant (1), donc enfin sur  $M^\vee$  (cf. la preuve du lemme 2.6). On en déduit  $M^\vee[1/X] = 0$  ce qui achève la preuve.

Lorsque  $P = B$ , on peut préciser la proposition 6.2.

**Proposition 6.8.** *Supposons  $P = B$  et  $\pi_B$  localement admissible (comme représentation de  $T(L)$ ), alors  $C_w(\pi_B)^{N_1}$  est un  $A[F]$ -module de torsion pour tout  $w \in W \setminus \{1\}$  (en particulier on retrouve  $D_\xi^\vee(C_w(\pi_B)) = 0$  par le (iii) de la proposition 2.7).*

La preuve est le cas particulier  $i = 0$  du (ii) du théorème 8.1 ci-après, auquel on renvoie le lecteur.

**Remarque 6.9.** Il est possible que, pour  $P \neq B$  et  $\pi_P$  localement admissible (comme représentation de  $L_P(L)$ ), le  $A[F]$ -module  $C_w(\pi_P)^{N_1}$  soit en fait encore de torsion pour  $w \in K_P \setminus \{1\}$  (voir aussi à ce propos la remarque 8.7).

### 7. Le cas des induites paraboliques II

On démontre la proposition 6.3, ce qui achève la preuve du théorème 6.1.

On conserve les notations des sections précédentes et on suppose  $P \neq G$  sinon il n’y a rien à montrer. On pose  $N_{P,0} \stackrel{\text{déf}}{=} N_P(L) \cap N_0 = \prod_{\alpha \in R^+ \setminus R_P^+} (N_\alpha(L) \cap N_0)$  et  $N_{P,1} \stackrel{\text{déf}}{=} N_P(L) \cap N_1 = N_{P,0} \cap N_1$ . Comme  $N_0$  est totalement décomposé, on a un produit semi-direct  $N_0 = N_{L_P,0} N_{P,0}$  (avec  $N_{P,0}$  distingué). Comme  $(R^+ \setminus R_P^+) \cap S \neq \emptyset$  (car  $P \neq G$ ), on a par (24) une suite exacte courte :

$$0 \rightarrow N_{P,1} \rightarrow N_{P,0} \rightarrow \text{Tr}_{L/\mathbb{Q}_p}(\mathcal{O}_L) \rightarrow 0$$

d’où on déduit que l’inclusion  $N_{P,0} \subseteq N_0$  induit un isomorphisme  $N_{P,0}/N_{P,1} \xrightarrow{\sim} N_0/N_1$ . Notons que  $N_{L_P,1} N_{P,1} \subsetneq N_1$  si  $P \neq B$  et que  $t N_{P,1} t^{-1} \subseteq N_{P,1}$ ,  $t N_{L_P,1} t^{-1} \subseteq N_{L_P,1}$  (puisque  $t N_P(L) t^{-1} = N_P(L)$ ,  $t N_{L_P}(L) t^{-1} = N_{L_P}(L)$  et  $t N_1 t^{-1} \subseteq N_1$ ) pour tout  $t \in \xi(\mathbb{Z}_p \setminus \{0\})$ .

**Lemme 7.1.** *Les inclusions  $N_{L_P,0} \subseteq N_{L_P,0} N_{P,0}$  et  $N_{P,0} \subseteq N_{L_P,0} N_{P,0}$  induisent un isomorphisme de groupes abéliens :*

$$N_{L_P,0}/N_{L_P,1} \times N_{P,0}/N_{P,1} \xrightarrow{\sim} N_0/(N_{L_P,1} N_{P,1}).$$

*Démonstration.* Par définition de  $N_{L_P,1}$  et de  $N_{P,1}$ , on a :

$$\prod_{\alpha \in R_P^+ \setminus S_P} (N_\alpha(L) \cap N_0) \subset N_{L_P,1} \quad \text{et} \quad \prod_{\alpha \in (R^+ \setminus R_P^+) \setminus (S \setminus S_P)} (N_\alpha(L) \cap N_0) \subset N_{P,1}$$

qui entraîne  $\prod_{\alpha \in R^+ \setminus S} N_\alpha(L) \cap N_0 \subset N_{L_P,1} N_{P,1}$ . On a par ailleurs un isomorphisme de groupes abéliens (rappelons que  $N_0$  est totalement décomposé) :

$$N_0 / \left( \prod_{\alpha \in R^+ \setminus S} (N_\alpha(L) \cap N_0) \right) \cong \prod_{\alpha \in S} (N_\alpha(L) \cap N_0) = \prod_{\alpha \in S_P} (N_\alpha(L) \cap N_0) \prod_{\alpha \in S \setminus S_P} (N_\alpha(L) \cap N_0). \quad (36)$$

De plus l'image de  $N_{L_P,1}$  (resp. de  $N_{P,1}$ ) dans le quotient (36) est clairement :

$$\text{Ker}_{S_P} \stackrel{\text{d\'ef}}{=} \text{Ker} \left( \prod_{\alpha \in S_P} (N_\alpha(L) \cap N_0) \xrightarrow{\sum_{\alpha \in S_P} \iota_\alpha} \mathcal{O}_L \xrightarrow{\psi \circ \text{Tr}_{L/\mathbb{Q}_P}} \mathbb{Z}_p \right)$$

(resp. avec partout  $S \setminus S_P$  au lieu de  $S_P$ ) de sorte que l'on a un isomorphisme de groupes ab\'eliens :

$$(N_{L_P,1} N_{P,1}) / \left( \prod_{\alpha \in R^+ \setminus S} (N_\alpha(L) \cap N_0) \right) \xrightarrow{\sim} \text{Ker}_{S_P} \times \text{Ker}_{S \setminus S_P}. \quad (37)$$

En utilisant les isomorphismes :

$$\begin{aligned} N_{L_P,0}/N_{L_P,1} &\xrightarrow{\sim} \left( \prod_{\alpha \in S_P} (N_\alpha(L) \cap N_0) \right) / \text{Ker}_{S_P} \\ N_{P,0}/N_{P,1} &\xrightarrow{\sim} \left( \prod_{\alpha \in S \setminus S_P} (N_\alpha(L) \cap N_0) \right) / \text{Ker}_{S \setminus S_P} \end{aligned}$$

on en d\'eduit le r\'esultat en faisant le quotient de (36) par (37). □

Via les isomorphismes  $N_0/N_1 \cong \mathbb{Z}_p$ ,  $N_{L_P,0}/N_{L_P,1} \xrightarrow{\sim} N_0/N_1 \cong \mathbb{Z}_p$  (si  $P \neq B$ ) et  $N_{P,0}/N_{P,1} \xrightarrow{\sim} N_0/N_1 \cong \mathbb{Z}_p$ , on voit que la suite exacte courte de groupes ab\'eliens  $0 \rightarrow N_1/(N_{L_P,1} N_{P,1}) \rightarrow N_0/(N_{L_P,1} N_{P,1}) \rightarrow N_0/N_1 \rightarrow 0$  s'identifie \`a  $0 \rightarrow 0 \rightarrow \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Z}_p \rightarrow 0$  si  $P = B$  et via le lemme 7.1 \`a :

$$\begin{aligned} 0 &\longrightarrow \mathbb{Z}_p \longrightarrow \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p \longrightarrow \mathbb{Z}_p \longrightarrow 0 \\ x &\longmapsto (x, -x) \\ (z, y) &\longmapsto z + y \end{aligned} \quad (38)$$

si  $P \neq B$ .

Rappelons que, par (33) et la proposition 6.7, on a :

$$D_\xi^\vee(\mathcal{C}_1(\pi_P)) = D_\xi^\vee(\mathbf{c}\text{-Ind}_{P^-(L) \cap N(L)}^{N(L)} \pi_P) \xrightarrow{\sim} D^\vee((\text{Ind}_{P^-(L) \cap N_0}^{N_0} \pi_P)^{N_1}). \quad (39)$$

La restriction \`a  $N_{P,0}$  induit un isomorphisme :

$$\text{Ind}_{P^-(L) \cap N_0}^{N_0} \pi_P \xrightarrow{\sim} \mathcal{C}(N_{P,0}, \pi_P) \cong \mathcal{C}(N_{P,0}, A) \otimes_A \pi_P \quad (40)$$

o\`u le terme de droite d\'esigne les fonctions localement constantes \`a valeurs dans  $\pi_P$  ou  $A$ , o\`u l'action de  $N_{P,0}$  est par translation \`a droite sur les fonctions (et triviale sur  $\pi_P$ ), et o\`u l'action de  $N_{L_P,0}$  est donn\'ee par :

$$(n_{L_P,0} h)(n_{P,0}) = \pi_P(n_{L_P,0}) (h(n_{L_P,0}^{-1} n_{P,0} n_{L_P,0})) \quad (41)$$

si  $n_{L_P,0} \in N_{L_P,0}$ ,  $n_{P,0} \in N_{P,0}$  et  $h \in \mathcal{C}(N_{P,0}, \pi_P)$ .

**Lemme 7.2.** *On a un isomorphisme de  $A[[N_0/(N_{L_P,1}N_{P,1})]]$ -modules :*

$$(\text{Ind}_{P^-(L)\cap N_0}^{N_0} \pi_P)^{N_{L_P,1}N_{P,1}} \cong \mathcal{C}(N_{P,0}/N_{P,1}, \pi_P^{N_{L_P,1}}) \cong \mathcal{C}(N_{P,0}/N_{P,1}, A) \otimes_A \pi_P^{N_{L_P,1}}$$

où la structure de  $A[[N_0/(N_{L_P,1}N_{P,1})]]$ -modules à droite est la structure évidente de  $A[[N_{P,0}/N_{P,1}]] \widehat{\otimes}_A A[[N_{L_P,0}/N_{L_P,1}]]$ -modules via l’isomorphisme du [lemme 7.1](#).

*Démonstration.* Comme  $N_{P,0}$  (et donc  $N_{P,1}$ ) agit trivialement sur  $\pi_P$ , on a :

$$(\text{c-Ind}_{P^-(L)\cap N_0}^{N_0} \pi_P)^{N_{P,1}} \cong \mathcal{C}(N_{P,0}/N_{P,1}, \pi_P)$$

par (40). Par le [lemme 7.1](#), l’action par conjugaison (41) de  $N_{L_P,0}$  (et donc de  $N_{L_P,1}$ ) sur  $N_{P,0}$  devient triviale dans le quotient abélien  $N_{P,0}/N_{P,1}$ . On en déduit facilement le lemme. □

Supposons dans un premier temps  $P \neq B$ . Le groupe  $N_{L_P,0}/N_{L_P,1} \cong \mathbb{Z}_p$  agit naturellement sur  $\pi_P^{N_{L_P,1}}$  et via l’isomorphisme  $N_{P,0}/N_{P,1} \cong \mathbb{Z}_p$  précédent, on a une injection :

$$\eta : \pi_P^{N_{L_P,1}} \hookrightarrow \mathcal{C}(N_{P,0}/N_{P,1}, \pi_P^{N_{L_P,1}}), \quad v \longmapsto (x \mapsto x(v)) = \eta(v)$$

où  $x \in N_{P,0}/N_{P,1}$  et  $v \in \pi_P^{N_{L_P,1}}$ . Rappelons que  $\pi_P^{N_{L_P,1}}$  et :

$$\mathcal{C}(N_{P,0}/N_{P,1}, \pi_P^{N_{L_P,1}})^{N_1} \stackrel{\text{lemme 7.2}}{\cong} (\mathcal{C}(N_{P,0}, \pi_P)^{N_{L_P,1}N_{P,1}})^{N_1} \cong \mathcal{C}(N_{P,0}, \pi_P)^{N_1}$$

sont munis d’une structure d’objets de  $\text{Mod}_A$  (pour les groupes réductifs respectifs  $L_P$  et  $G$ , cf. §3 et (ii) du [lemme 6.6](#)).

**Lemme 7.3.** *L’injection  $\eta$  induit un isomorphisme dans  $\text{Mod}_A$  :*

$$\pi_P^{N_{L_P,1}} \xrightarrow{\sim} \mathcal{C}(N_{P,0}/N_{P,1}, \pi_P^{N_{L_P,1}})^{N_1}.$$

*Démonstration.* Il faut montrer que  $\eta$  induit un isomorphisme de  $A[[X]][[F]]$ -modules qui commute aux actions de  $\mathbb{Z}_p^\times$ . Posons  $N'_1 \stackrel{\text{déf}}{=} N_{L_P,1}N_{P,1}$ , un sous-groupe distingué de  $N_1$  (cf. [lemme 7.1](#)). Par le [lemme 7.1](#) et le [lemme 7.2](#), on voit que l’action de  $N_0/N'_1 \cong N_{L_P,0}/N_{L_P,1} \times N_{P,0}/N_{P,1} \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$  sur  $\mathcal{C}(N_{P,0}/N_{P,1}, \pi_P^{N_{L_P,1}}) \cong \mathcal{C}(\mathbb{Z}_p, \pi_P^{N_{L_P,1}})$  est donnée par :

$$((z, y)(f))(x) = z(f(x + y)). \tag{42}$$

Par la suite exacte (38) et par (42), un élément  $f \in \mathcal{C}(N_{P,0}/N_{P,1}, \pi_P^{N_{L_P,1}})$  est invariant sous  $N_1$ , ou de manière équivalente sous  $N_1/N'_1 \cong \mathbb{Z}_p$ , s’il vérifie  $y(f(x - y)) = f(x)$  pour tout  $x \in \mathbb{Z}_p$  et tout  $y \in \mathbb{Z}_p$ . En posant  $v \stackrel{\text{déf}}{=} f(0) \in \pi_P^{N_{L_P,1}}$  et en faisant  $y = x$ , on obtient  $f(x) = x(v)$ , ce qui montre la surjectivité de  $\eta$ .

Si  $x_0 \in N_0/N_1 \cong \mathbb{Z}_p$  et  $f = \eta(v) \in \mathcal{C}(N_{P,0}/N_{P,1}, \pi_P^{N_{L_P,1}})^{N_1}$ , on a (via (38)) :

$$(x_0(f))(x) = ((0, x_0)(f))(x) = f(x + x_0) = (x + x_0)(v) = x(x_0(v)) = \eta(x_0(v))(x)$$

ce qui montre la compatibilité à l'action de  $A[[X]]$ .

On montre la compatibilité à l'action de  $F$ , laissant celle à l'action de  $\mathbb{Z}_p^\times$ , analogue en plus facile, au lecteur. Comme  $\xi(p)N'_1\xi(p)^{-1} \subseteq N'_1$ , on peut définir pour tout  $f \in \mathcal{C}(N_{P,0}, \pi_P)^{N'_1}$  :

$$\xi(p) \cdot_{N'_1} f \stackrel{\text{déf}}{=} \sum_{n'_1 \in N'_1/\xi(p)N'_1\xi(p)^{-1}} n'_1 \xi(p) f \in \mathcal{C}(N_{P,0}, \pi_P)^{N'_1}.$$

Via  $\mathcal{C}(N_{P,0}, \pi_P)^{N'_1} \cong \mathcal{C}(\mathbb{Z}_p, \pi_P^{N_{Lp,1}})$  (lemme 7.2), un petit calcul montre que cette action est explicitement donnée par :

$$(\xi(p) \cdot_{N'_1} f)(x) = \sum_{n_{Lp,1} \in N_{Lp,1}/\xi(p)N_{Lp,1}\xi(p)^{-1}} n_{Lp,1} \xi(p)(f(x/p)) \quad (43)$$

où  $f(x/p) = 0$  si  $x \in \mathbb{Z}_p \setminus p\mathbb{Z}_p$ . Par ailleurs, pour tout  $f \in \mathcal{C}(N_{P,0}, \pi_P)^{N_1}$  on a l'égalité suivante dans  $\mathcal{C}(N_{P,0}, \pi_P)^{N_1}$  :

$$\sum_{n_1 \in N_1/\xi(p)N_1\xi(p)^{-1}} n_1 \xi(p) f = \sum_{\bar{n}_1 \in (N_1/N'_1)/\xi(p)(N_1/N'_1)\xi(p)^{-1}} \bar{n}_1(\xi(p) \cdot_{N'_1} f). \quad (44)$$

(On laisse cette vérification facile au lecteur ; considérer la chaîne d'inclusions  $\xi(p)N_1\xi(p)^{-1} \subseteq N'_1(\xi(p)N_1\xi(p)^{-1}) \subseteq N_1$  comme dans la preuve du lemme 4.1 où  $N'_1(\xi(p)N_1\xi(p)^{-1})$  est le sous-groupe de  $N_1$  engendré par  $N'_1$  et  $\xi(p)N_1\xi(p)^{-1}$ , et remarquer que  $N'_1 \cap \xi(p)N_1\xi(p)^{-1} = \xi(p)N'_1\xi(p)^{-1}$ .) En combinant (43), (44) et (42) (appliqué avec  $(z, y) = (i, -i) \in N_1/N'_1 \subseteq N_0/N'_1$ ), on voit que l'action de  $F$  sur  $f = \eta(v) \in \mathcal{C}(N_{P,0}, \pi_P)^{N_1} \cong \mathcal{C}(\mathbb{Z}_p, \pi_P^{N_{Lp,1}})^{N_1/N'_1}$  est explicitement donnée par :

$$F(\eta(v))(x) = \sum_{i=0}^{p-1} i \left( \sum_{n_{Lp,1} \in N_{Lp,1}/\xi(p)N_{Lp,1}\xi(p)^{-1}} n_{Lp,1} \xi(p) \left( \frac{x-i}{p}(v) \right) \right) \quad (45)$$

où  $((x-i)/p)(v) = 0$  si  $x$  n'est pas congru à  $i$  modulo  $p$ . En notant  $i_x \in \{0, \dots, p-1\}$  l'unique entier congru à  $x \in \mathbb{Z}_p$  modulo  $p$  et  $n_x \in \xi(p)N_{Lp,0}\xi(p)^{-1} \subseteq N_{Lp,0}$  un relevé de  $x - i_x \in p\mathbb{Z}_p$  via  $\xi(p)N_{Lp,0}\xi(p)^{-1}/\xi(p)N_{Lp,1}\xi(p)^{-1} \xrightarrow{\sim} p\mathbb{Z}_p$ , (45) se réécrit :

$$F(\eta(v))(x) = i_x \left( \sum_{N_{Lp,1}/\xi(p)N_{Lp,1}\xi(p)^{-1}} n_{Lp,1} n_x \xi(p)(v) \right)$$

ou encore :

$$F(\eta(v))(x) = x \left( \sum_{N_{Lp,1}/\xi(p)N_{Lp,1}\xi(p)^{-1}} n_x^{-1} n_{Lp,1} n_x \xi(p)(v) \right). \quad (46)$$

Comme  $N_{Lp,1}$  est distingué dans  $N_{Lp,0}$  et  $\xi(p)N_{Lp,1}\xi(p)^{-1}$  est distingué dans  $\xi(p)N_{Lp,0}\xi(p)^{-1}$ , l'ensemble  $\{n_x^{-1}n_{Lp,1}n_x\}$  dans la somme ci-dessus est encore

un système de représentants de  $N_{L_p,1}/\xi(p)N_{L_p,1}\xi(p)^{-1}$  dans  $N_{L_p,1}$  pour chaque  $x \in \mathbb{Z}_p$ . On en déduit que (46) se réécrit :

$$F(\eta(v))(x) = x \left( \sum_{N_{L_p,1}/\xi(p)N_{L_p,1}\xi(p)^{-1}} n_{L_p,1}\xi(p)(v) \right) = x(F(v))$$

pour l'action de  $F$  sur  $\pi_p^{N_{L_p,1}}$  à droite. Cela montre  $F(\eta(v)) = \eta(F(v))$ . □

Par le lemme 7.3, on a donc  $D^\vee(\mathcal{C}(N_{P,0}, \pi_P)^{N_1}) \xrightarrow{\sim} D^\vee_\xi(\pi_P)$  ce qui, avec (40) et (39), montre la proposition 6.3 lorsque  $P \neq B$  (tous les isomorphismes étant par ailleurs clairement fonctoriels en  $\pi_P$ ).

On suppose maintenant  $P = B$ . Par le lemme 7.2 on a un isomorphisme de  $A[[X]]$ -modules  $\mathcal{C}(N_0, \pi_B)^{N_1} \cong \mathcal{C}(\mathbb{Z}_p, A) \otimes_A \pi_B$ . En munissant le terme de droite d'une action de  $\mathbb{Z}_p \setminus \{0\}$  donnée par l'action de  $\xi(\mathbb{Z}_p \setminus \{0\}) \subseteq T(L)$  sur  $\pi_B$  et par  $f \mapsto (x \mapsto f(x/a))$  sur  $\mathcal{C}(\mathbb{Z}_p, A)$  où  $a \in \mathbb{Z}_p \setminus \{0\}$  et  $f(x/a) = 0$  si  $x/a \in \mathbb{Q}_p \setminus \mathbb{Z}_p$ , on vérifie facilement qu'il s'agit d'un isomorphisme dans  $\text{Mod}_A$  (cf. (43) avec  $N'_1 = N_1$  et  $N_{L_p,1} = \{1\}$ ).

**Lemme 7.4.** (i) Si  $M_B \subseteq \pi_B$  est un sous- $A$ -module de type fini stable par  $\xi(\mathbb{Z}_p \setminus \{0\})$  alors  $\mathcal{C}(\mathbb{Z}_p, A) \otimes_A M_B$  est un sous- $A[[X]][F]$ -module de  $\mathcal{C}(N_0, \pi_B)^{N_1} \cong \mathcal{C}(\mathbb{Z}_p, A) \otimes_A \pi_B$  stable par  $\mathbb{Z}_p^\times$  qui vérifie les conditions (1).

(i) Tout sous- $A[[X]][F]$ -module de  $\mathcal{C}(N_0, \pi_B)^{N_1}$  stable par  $\mathbb{Z}_p^\times$  qui vérifie (1) est contenu dans  $\mathcal{C}(\mathbb{Z}_p, A) \otimes_A M_B$  pour  $M_B \subseteq \pi_B$  un sous- $A$ -module de type fini stable par  $\xi(\mathbb{Z}_p \setminus \{0\})$ .

*Démonstration.* (i) On a :

$$\text{Hom}_A(\mathcal{C}(\mathbb{Z}_p, A) \otimes_A M_B, A) \cong A[[X]] \otimes_A M_B^\vee$$

qui montre que  $\mathcal{C}(\mathbb{Z}_p, A) \otimes_A M_B$  est un  $A[[X]]$ -module admissible puisque  $M_B^\vee$  est de type fini sur  $A$ . Montrons qu'il est de type fini sur  $A[[X]][F]$ . Par dévissage ( $\mathcal{C}(\mathbb{Z}_p, A)$  est plat sur  $A$ ), on se ramène au cas  $A = k_E$ . Comme  $k'_E[[X]][F] \cong k'_E \otimes_{k_E} (k_E[[X]][F])$  est de type fini sur  $k_E[[X]][F]$  pour toute extension finie  $k'_E$  de  $k_E$ , on peut quitte à étendre les scalaires supposer que  $M_B|_{\xi(\mathbb{Q}_p^\times)}$  est une extension successive de caractères lisses de  $\xi(\mathbb{Q}_p^\times)$  (à valeurs dans  $k_E^\times$ ). Par dévissage encore, on est donc ramené au cas  $\dim_{k_E} M_B = 1$  et, quitte à twister l'action de  $\xi(\mathbb{Z}_p \setminus \{0\})$  sur  $\mathcal{C}(\mathbb{Z}_p, k_E) \otimes_{k_E} M_B$ , on peut même supposer que  $M_B|_{\xi(\mathbb{Q}_p^\times)}$  est le caractère trivial. On est finalement ramené à  $\mathcal{C}(\mathbb{Z}_p, k_E)$  qui est bien de type fini sur  $k_E[[X]][F]$ , engendré par exemple par la fonction  $\mathbf{1}_{\mathbb{Z}_p}$ .

(ii) Soit  $M \subseteq \mathcal{C}(\mathbb{Z}_p, A) \otimes_A \pi_B$  stable par  $\mathbb{Z}_p^\times$  et qui vérifie (1). En prenant  $\text{Hom}_A(\cdot, A)$ , on a une surjection de  $A[[X]][F]$ -modules  $A[[X]] \widehat{\otimes}_A \pi_B^\vee \rightarrow M^\vee$  compatible à  $\mathbb{Z}_p^\times$  où  $M^\vee$  est un  $A[[X]]$ -module de type fini, d'où une surjection de  $A$ -modules  $\pi_B^\vee \rightarrow M^\vee / X M^\vee$  qui commute à  $F$  et  $\mathbb{Z}_p^\times$ . Comme  $F = \xi(p)$  est ici bijectif sur  $\pi_B$ ,

donc sur  $\pi_B^\vee$ , il est surjectif (et  $A$ -linéaire) sur le  $A$ -module de type fini  $M^\vee / XM^\vee$ , donc aussi bijectif. Par un argument classique (parfois appelé “Dwork’s trick”), on en déduit une section  $A[[F]]$ -linéaire canonique  $s : M^\vee / XM^\vee \hookrightarrow M^\vee$  de la surjection  $M^\vee \twoheadrightarrow M^\vee / XM^\vee$  qui commute avec la section évidente  $\pi_B^\vee \hookrightarrow A[[X]] \widehat{\otimes}_A \pi_B^\vee$  et avec l’action de  $\mathbb{Z}_p^\times$ . Autrement dit la surjection  $A[[X]] \widehat{\otimes}_A \pi_B^\vee \twoheadrightarrow M^\vee$  se factorise comme suit :

$$A[[X]] \widehat{\otimes}_A \pi_B^\vee \twoheadrightarrow A[[X]] \otimes_A M^\vee / XM^\vee \xrightarrow{\text{Id} \otimes s} M^\vee.$$

Et on voit que  $M_B \stackrel{\text{déf}}{=} \text{Hom}_A(M^\vee / XM^\vee, A)$  convient. □

Le lemme suivant est un exercice simple sur les  $(\varphi, \Gamma)$ -modules que l’on laisse au lecteur.

**Lemme 7.5.** *Soit  $M$  un  $A$ -module de type fini muni d’une action  $A$ -linéaire lisse de  $\mathbb{Q}_p^\times$ ,  $V(M)$  la représentation de  $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p)$  sur  $A$  associée par la réciprocity locale et  $D(M)$  le  $(\varphi, \Gamma)$ -module associé à  $V(M)$  par le foncteur covariant de [Fontaine 1990, théorème A.3.4.3]. On a  $D(M) \cong A[[X]][1/X] \otimes_A M$  où l’action de  $\Gamma \cong \mathbb{Z}_p^\times$  est l’unique action  $A[[X]][1/X]$ -semi-linéaire donnée par l’action de  $\mathbb{Z}_p^\times$  sur  $M$  et où l’action de  $\varphi$  est l’unique action semi-linéaire donnée par l’action de  $p$  sur  $M$ .*

Par le lemme 7.4, on obtient un isomorphisme dans  $\widehat{\Phi}\Gamma_A^{\text{ét}}$  :

$$D^\vee(\mathcal{C}(N_0, \pi_B)^{N_1}) \cong \varprojlim_{M_B} (A[[X]][1/X] \otimes_A M_B^\vee) \tag{47}$$

où la limite projective est prise sur les éléments  $M_B$  de  $\mathcal{M}(\pi_B)$  et où l’action de  $\varphi$  et de  $\mathbb{Z}_p^\times$  (ou de manière équivalente de  $\mathbb{Q}_p^\times$ ) sur  $M_B^\vee$  est donnée par  $(\varphi(f))(m) = f(\xi(p)^{-1}(m))$  et  $(x(f))(m) = f(\xi(x)^{-1}(m))$ ,  $x \in \mathbb{Z}_p^\times$ . Par le lemme 7.5 appliqué à  $M_B^\vee$  et le fait que le foncteur  $(\varphi, \Gamma)$ -module commute à la dualité, on a  $A[[X]][1/X] \otimes_A M_B^\vee \cong D^\vee(M_B)$  pour  $M_B \in \mathcal{M}(\pi_B)$  (cf. § 3), d’où on déduit  $D^\vee(\mathcal{C}(N_0, \pi_B)^{N_1}) \cong D_\xi^\vee(\pi_B)$  par (47). Par (40) et (39), on en déduit la proposition 6.3 lorsque  $P = B$  (la functorialité étant là aussi claire).

**Exemple 7.6.** Soit  $\chi : T(L) \rightarrow A^\times$  un caractère lisse, alors  $D_\xi^\vee(\text{Ind}_{B^-(L)}^{G(L)} \chi)$  est le  $(\varphi, \Gamma)$ -module du dual du caractère de  $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p)$  sur  $A$  donné (via la réciprocity locale) par  $\mathbb{Q}_p^\times \rightarrow A^\times$ ,  $x \mapsto \chi(\xi(x))$ .

**Proposition 7.7.** *Supposons  $\pi_B$  localement admissible (comme représentation de  $T(L)$ ), alors le  $A[[X]][F]$ -module  $\mathcal{C}_1(\pi_B)^{N_1}$  satisfait la propriété Ad (définition 2.2).*

*Démonstration.* En procédant comme dans la preuve de la proposition 6.7, par le (ii) du lemme 2.5 il suffit de montrer le résultat pour le sous- $A[[X]][F]$ -module  $\mathcal{C}(N_0, \pi_B)^{N_1} \cong \mathcal{C}(\mathbb{Z}_p, A) \otimes_A \pi_B$ . Comme  $\pi_B$  est un  $A[F]$ -module de torsion (car  $\pi_B$  est localement admissible), tout sous- $A[[X]][F]$ -module de type fini de  $\mathcal{C}(\mathbb{Z}_p, A) \otimes_A$

$\pi_B$  est contenu dans  $\mathcal{C}(\mathbb{Z}_p, A) \otimes_A M_B$  où  $M_B \subseteq \pi_B$  est un sous- $A$ -module de type fini stable par  $F$ . On en déduit le résultat par le (i) du [lemme 7.4](#) et le (i) du [lemme 2.1](#). □

### 8. Le cas des $H^i(N_1, \mathcal{C}_w(\pi_B))$ pour $i \geq 1$

On montre que les  $A[F]$ -modules  $H^i(N_1, \mathcal{C}_w(\pi_B))$  (cf. fin du § 3) sont très souvent de torsion.

On garde les notations des sections précédentes.

**Théorème 8.1.** *Soit  $\pi_B$  une représentation lisse de  $T(L)$  sur  $A$ .*

- (i) *Le  $A[F]$ -module  $H^i(N_1, \mathcal{C}_1(\pi_B))$  est de torsion pour tout  $i \geq 1$ .*
- (ii) *Si  $\pi_B$  est de plus localement admissible (comme représentation de  $T(L)$ ), le  $A[F]$ -module  $H^i(N_1, \mathcal{C}_w(\pi_B))$  est de torsion pour tout  $i \geq 0$  et tout  $w \in W \setminus \{1\}$ .*

Le [théorème 8.1](#) va résulter de la combinaison de quatre propositions énoncées (et démontrées) ci-dessous.

Pour tout  $w \in W$ , posons  $\mathcal{C}_{w,0}(\pi_B) \stackrel{\text{déf}}{=} \mathcal{C}((w^{-1}N^-(L)w \cap N_0) \setminus N_0, \pi_B^w)$  (notons que (35) est un isomorphisme lorsque  $P = B$ ). C'est un sous- $A$ -module de  $\mathcal{C}_w(\pi_B)$  stable par l'action de  $N_0$  et de  $\xi(\mathbb{Z}_p \setminus \{0\})$  (pour cette dernière cela découle de (34), voir la preuve du (i) du [lemme 6.6](#)). En particulier on peut définir pour tout  $i \geq 0$  et tout  $w \in W$  des objets de  $\text{Mod}_A$ ,  $H^i(N_1, \mathcal{C}_{w,0}(\pi_B))$  et  $H^i(N_1, \mathcal{C}_w(\pi_B)/\mathcal{C}_{w,0}(\pi_B))$ , comme à la fin du § 3.

**Proposition 8.2.** *Si les assertions (i) et (ii) du [théorème 8.1](#) sont vraies avec  $\mathcal{C}_{1,0}(\pi_B)$  et  $\mathcal{C}_{w,0}(\pi_B)$  au lieu de  $\mathcal{C}_1(\pi_B)$  et  $\mathcal{C}_w(\pi_B)$ , alors le [théorème 8.1](#) est vrai.*

*Démonstration.* La suite exacte courte :

$$0 \rightarrow \mathcal{C}_{w,0}(\pi_B) \rightarrow \mathcal{C}_w(\pi_B) \rightarrow \mathcal{C}_w(\chi)/\mathcal{C}_{w,0}(\pi_B) \rightarrow 0$$

donne des suites exactes dans  $\text{Mod}_A$  pour tout  $i \geq 1$  :

$$H^{i-1}(N_1, \mathcal{C}_w(\pi_B)/\mathcal{C}_{w,0}(\pi_B)) \rightarrow H^i(N_1, \mathcal{C}_{w,0}(\pi_B)) \rightarrow H^i(N_1, \mathcal{C}_w(\pi_B)) \rightarrow H^i(N_1, \mathcal{C}_w(\pi_B)/\mathcal{C}_{w,0}(\pi_B)). \quad (48)$$

La même preuve que celle de [[Hauseux 2014](#), lemme 3.3.1] (voir aussi celle du (i) du [lemme 6.6](#)) montre que  $\xi(p)$  est localement nilpotent sur  $\mathcal{C}_w(\pi_B)/\mathcal{C}_{w,0}(\pi_B)$  pour tout  $w \in W$ , et donc  $F$  est localement nilpotent sur  $H^i(N_1, \mathcal{C}_w(\chi)/\mathcal{C}_{w,0}(\pi_B))$  pour tout  $i \geq 0$  et tout  $w \in W$  (cf. (14)). En particulier  $H^i(N_1, \mathcal{C}_w(\pi_B)/\mathcal{C}_{w,0}(\pi_B))$  est toujours de  $A[F]$ -torsion. Par le (i) du [lemme 2.5](#) et (48), cela montre la proposition. □

**Proposition 8.3.** *Le  $A[F]$ -module  $H^i(N_1, \mathcal{C}_{1,0}(\pi_B))$  est nul pour tout  $i \geq 1$ .*

*Démonstration.* Comme  $N_0/N_1 \cong \mathbb{Z}_p$  est de dimension 1, on a pour tout  $i \geq 1$  une suite exacte courte déduite de la suite spectrale de Hochschild–Serre (cf. [Hauseux 2014, §3.2(12)]) :

$$0 \rightarrow H^1(\mathbb{Z}_p, H^{i-1}(N_1, \mathcal{C}_{1,0}(\pi_B))) \rightarrow H^i(N_0, \mathcal{C}_{1,0}(\pi_B)) \rightarrow H^0(\mathbb{Z}_p, H^i(N_1, \mathcal{C}_{1,0}(\pi_B))) \rightarrow 0. \quad (49)$$

Comme  $\mathcal{C}_{1,0}(\pi_B) = \mathcal{C}(N_0, \pi_B)$  est une représentation injective de  $N_0$  (agissant par translation à droite sur les fonctions), on a  $H^i(N_0, \mathcal{C}_{1,0}(\pi_B)) = 0$  pour  $i \geq 1$ . Par (49) on en déduit  $H^0(\mathbb{Z}_p, H^i(N_1, \mathcal{C}_{1,0}(\pi_B))) = 0$ . Comme  $\mathbb{Z}_p$  est un pro- $p$ -groupe, un  $A$ -module non nul avec une action lisse de  $\mathbb{Z}_p$  a toujours des vecteurs non nuls invariants sous  $\mathbb{Z}_p$ , d'où  $H^i(N_1, \mathcal{C}_{1,0}(\pi_B)) = 0$  pour  $i \geq 1$ .  $\square$

Par la proposition 8.2, cela montre le (i) du théorème 8.1.

On fixe dans la suite  $w \neq 1$ . On va montrer le (ii) du théorème 8.1 pour  $\mathcal{C}_{w,0}(\pi_B)$ . Par un dévissage sur  $A$  évident et le (i) du lemme 2.5, on peut supposer  $A = k_E$ . Comme  $\pi_B$  est une représentation lisse localement admissible du groupe commutatif  $T(L)$  sur  $k_E$ , on peut l'écrire comme limite inductive  $\pi_B = \varinjlim_l \pi_{B,l}$  de représentations  $\pi_{B,l}$  de  $T(L)$  de dimension finie sur  $k_E$ . Comme  $N_0$  est compact, toute fonction de  $\mathcal{C}_{w,0}(\pi_B)$  est à valeurs dans une sous-représentation  $\pi_{B,l}^w$  de  $\pi_B^w$  de dimension finie sur  $k_E$ , de sorte que l'on a  $\mathcal{C}_{w,0}(\pi_B) = \varinjlim_l \mathcal{C}_{w,0}(\pi_{B,l})$  (avec des notations évidentes). Comme la cohomologie (continue) commute aux limites inductives, on voit qu'il suffit de traiter le cas où  $\pi_B$  est de dimension finie sur  $k_E$ , ce que l'on suppose dans la suite. On va en fait montrer que  $H^i(N_1, \mathcal{C}_{w,0}(\pi_B))$  est alors aussi de dimension finie sur  $k_E$  pour tout  $i \geq 0$ , ce qui implique qu'il est *a fortiori* de torsion comme  $k_E[F]$ -module.

On note  $N^S \stackrel{\text{déf}}{=} \prod_{\alpha \in R^+ \setminus S} N_\alpha$  : c'est un sous-groupe algébrique fermé normal de  $N$  de quotient abélien isomorphe à  $\prod_{\alpha \in S} N_\alpha$ . De plus, on a  $N^S(L) \cap N_0 \subseteq N_1 \subseteq N_0$ . Soit  $R_w^+ \stackrel{\text{déf}}{=} R^+ \cap w^{-1}(R^+)$ , comme  $N_0$  est totalement décomposé, on a :

$$\prod_{\alpha \in R_w^+} (N_\alpha(L) \cap N_0) \cong w^{-1}N(L)w \cap N_0 \xrightarrow{\sim} (w^{-1}N^-(L)w \cap N_0) \setminus N_0. \quad (50)$$

**Proposition 8.4.** *Il existe une suite  $0 = N_0^S \subseteq N_1^S \subseteq N_2^S \subseteq \dots \subseteq N_m^S = N^S$  de sous-groupes algébriques fermés de  $N^S$  vérifiant les conditions suivantes :*

- (i)  $N_j^S$  est un sous-groupe normal de  $N$  pour tout  $j \in \{0, \dots, m\}$  ;
- (ii) pour tout  $j \in \{1, \dots, m\}$ , ou bien l'action de  $(N_j^S(L) \cap N_0)/(N_{j-1}^S(L) \cap N_0)$  sur  $\mathcal{C}_{w,0}(\pi_B)^{N_{j-1}^S(L) \cap N_0}$  est triviale, ou bien  $\mathcal{C}_{w,0}(\pi_B)^{N_{j-1}^S(L) \cap N_0}$  est une représentation injective lisse de  $(N_j^S(L) \cap N_0)/(N_{j-1}^S(L) \cap N_0)$  sur  $k_E$ .

*Démonstration.* Si  $N^S$  est trivial (i.e., si  $R^+ = S$ ), il n'y a rien à montrer. On suppose donc  $N^S$  non trivial dans la suite.

Construisons d'abord  $N_1^S$ . Soit  $\alpha_1 \in R^+ \setminus S$  une racine de hauteur maximale dans  $R^+$  (cf. par exemple [Breuil et Herzig 2015, Remark 2.5.3]), alors  $N_{\alpha_1}$  est un sous-groupe algébrique de  $N^S$  normal dans  $N$  par [Digne et Michel 1991, Theorem 0.31(iv)] (en fait  $N_{\alpha_1}$  commute même à tout élément de  $N$  par [loc. cit.]).

Supposons  $w(\alpha_1) \in R^-$ , i.e.,  $\alpha_1 \notin R_w^+$  ou de manière équivalente :

$$N_{\alpha_1} \subseteq w^{-1}N^-w \cap N,$$

alors pour tout  $n_0 \in N_0$  et  $n_{\alpha_1} \in N_{\alpha_1}(L) \cap N_0$  on a dans  $(w^{-1}N^-(L)w \cap N_0) \setminus N_0$  :

$$\begin{aligned} (w^{-1}N^-(L)w \cap N_0)n_0n_{\alpha_1} &= (w^{-1}N^-(L)w \cap N_0)n_0n_{\alpha_1}n_0^{-1}n_0 \\ &= (w^{-1}N^-(L)w \cap N_0)n_0 \end{aligned}$$

puisque  $n_0n_{\alpha_1}n_0^{-1} \in N_{\alpha_1}(L) \cap N_0$  et  $N_{\alpha_1}(L) \cap N_0 \subseteq w^{-1}N^-(L)w \cap N_0$ . Donc l'action de  $N_{\alpha_1}(L) \cap N_0$  sur  $\mathcal{C}_{w,0}(\pi_B)$  est triviale.

Supposons  $w(\alpha_1) \in R^+$ , i.e.,  $\alpha_1 \in R_w^+$  ou de manière équivalente  $N_{\alpha_1} \subseteq w^{-1}Nw \cap N$ . En utilisant (50), on voit que l'on a un isomorphisme compatible à l'action de  $N_{\alpha_1}(L) \cap N_0$  :

$$\mathcal{C}_{w,0}(\pi_B)|_{N_{\alpha_1}(L) \cap N_0} \cong \bigotimes_{\alpha \in R_w^+} \mathcal{C}(N_{\alpha}(L) \cap N_0, \pi_B^w)$$

(le produit tensoriel étant sur  $k_E$ ) où l'action de  $N_{\alpha_1}(L) \cap N_0$  est triviale sur  $\mathcal{C}(N_{\alpha}(L) \cap N_0, \pi_B^w)$  si  $\alpha \neq \alpha_1$  et est la translation à droite sur  $\mathcal{C}(N_{\alpha_1}(L) \cap N_0, \pi_B^w)$  ( $\pi_B^w$  ne jouant aucun rôle). Comme  $\mathcal{C}(N_{\alpha_1}(L) \cap N_0, \pi_B^w)$  est une représentation injective de  $N_{\alpha_1}(L) \cap N_0$  sur  $k_E$ , on voit que  $\mathcal{C}_{w,0}(\pi_B)|_{N_{\alpha_1}(L) \cap N_0}$  est une somme directe de représentations injectives de  $N_{\alpha_1}(L) \cap N_0$  sur  $k_E$ , donc est injective.

On peut poser  $N_1^S \stackrel{\text{def}}{=} N_{\alpha_1}$ . Si  $N_1^S = N^S$ , c'est fini. Sinon, en remplaçant  $N$  par  $N/N_1^S$ ,  $N^S$  par  $N^S/N_1^S$ ,  $R^+$  par  $R^+ \setminus \{\alpha_1\}$ ,  $R_w^+$  par  $R_w^+ \setminus \{\alpha_1\}$  (qui peut être égal à  $R_w^+$  selon les cas) et  $\mathcal{C}_{w,0}(\pi_B)$  par :

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_{w,0}(\pi_B)^{N_1^S(L) \cap N_0} &\cong \mathcal{C}((w^{-1}N^-(L)w \cap N_0) \setminus N_0 / (N_{\alpha_1}(L) \cap N_0), \pi_B^w) \\ &\cong \mathcal{C}(((w^{-1}N^-(L)w N_{\alpha_1}(L)) \cap N_0) \setminus N_0, \pi_B^w) \\ &\cong \bigotimes_{\alpha \in R_w^+ \setminus \{\alpha_1\}} \mathcal{C}(N_{\alpha}(L) \cap N_0, \pi_B^w), \end{aligned}$$

le même argument donne  $\alpha_2 \in (R^+ \setminus \{\alpha_1\}) \setminus S$  (de hauteur maximale dans  $R^+ \setminus \{\alpha_1\}$ ) tel que  $N_{\alpha_2}$  est un sous-groupe algébrique de  $N^S/N_1^S$  normal dans  $N/N_1^S$ , et tel que l'action de  $N_{\alpha_2}(L) \cap N_0$  sur  $\mathcal{C}_{w,0}(\pi_B)^{N_1^S(L) \cap N_0}$  par translation à droite est soit triviale soit "injective" selon que  $w(\alpha_2) \in R^-$  ou  $w(\alpha_2) \in R^+$ . On pose alors  $N_2^S \stackrel{\text{def}}{=} N_1^S N_{\alpha_2} = N_{\alpha_2} N_1^S \subseteq N^S$ , qui est bien normal dans  $N$ . On poursuit par une récurrence évidente, qui s'arrête lorsque  $N_i^S = N^S$ .  $\square$

Par le (i) de la [proposition 8.4](#),  $N_{j,0}^S \stackrel{\text{d\u00e9f}}{=} N_j^S(L) \cap N_0$  est en particulier un sous-groupe normal de  $N_1$  pour tout  $j \in \{0, \dots, m\}$ .

**Proposition 8.5.** *Pour tout  $i \geq 0$  et tout  $j \in \{0, \dots, m\}$ , le  $k_E$ -espace vectoriel  $H^i(N_1/N_{j,0}^S, \mathcal{C}_{w,0}(\pi_B)^{N_{j,0}^S})$  est de dimension finie (rappelons que  $\dim_{k_E} \pi_B < +\infty$ ).*

*D\u00e9monstration.* On fait une r\u00e9currence descendante sur  $j$ .

Supposons d'abord  $j = m$ . Alors  $N_0/N_{m,0}^S = N_0/(N^S(L) \cap N_0)$  est le groupe ab\u00e9lien  $\prod_{\alpha \in S} (N_\alpha(L) \cap N_0)$  et

$$\mathcal{C}_{w,0}(\pi_B)^{N^S(L) \cap N_0} = \mathcal{C} \left( \prod_{\alpha \in S_w} (N_\alpha(L) \cap N_0), \pi_B^w \right)$$

o\u00f9  $S_w \stackrel{\text{d\u00e9f}}{=} S \cap R_w^+$ . Comme  $w \neq 1$ , il existe  $\beta \in S \setminus S_w$ . On fixe un tel  $\beta$  et on d\u00e9finit une injection (d'ensembles) :

$$j_{w,\beta} : \prod_{\alpha \in S_w} (N_\alpha(L) \cap N_0) \hookrightarrow N_1, \quad n \mapsto \iota_\beta^{-1}(-\ell(n))n$$

o\u00f9  $\iota_\beta^{-1}(-\ell(n))$  est l'unique \u00e9l\u00e9ment de  $N_\beta(L) \cap N_0$  dont l'image par  $\iota_\beta$  est  $-\ell(n) \in \mathcal{O}_L$  (cf. [\(24\)](#), on a bien alors  $\iota_\beta^{-1}(-\ell(n))n \in N_1$ ). Compos\u00e9e avec la projection  $N_1 \rightarrow N_1/(N^S(L) \cap N_0)$ ,  $j_{w,\beta}$  induit une injection de groupes ab\u00e9liens (en fait de  $\mathbb{Z}_p$ -modules libres de type fini) :

$$\overline{j_{w,\beta}} : \prod_{\alpha \in S_w} (N_\alpha(L) \cap N_0) \hookrightarrow N_1/(N^S(L) \cap N_0)$$

dont le conoyau est sans torsion (regarder le conoyau dans  $N_0/(N^S(L) \cap N_0) \cong \prod_{\alpha \in S} (N_\alpha(L) \cap N_0)$ ). Notons  $N_{1,w,\beta}$  un facteur direct de  $\prod_{\alpha \in S_w} (N_\alpha(L) \cap N_0)$  dans  $N_1/(N^S(L) \cap N_1)$  via l'injection  $\overline{j_{w,\beta}}$  ( $N_{1,w,\beta}$  est donc isomorphe \u00e0 une somme de copies de  $\mathbb{Z}_p$ ). Par la suite spectrale de Hochschild–Serre, il suffit de montrer que le  $k_E$ -espace vectoriel :

$$H^{i_1} \left( N_{1,w,\beta}, H^{i_2} \left( \prod_{\alpha \in S_w} (N_\alpha(L) \cap N_0), \mathcal{C} \left( \prod_{\alpha \in S_w} (N_\alpha(L) \cap N_0), \pi_B^w \right) \right) \right)$$

est de dimension finie sur  $k_E$  pour tout couple d'entiers  $(i_1, i_2)$ . Comme il est nul si  $i_2 > 0$  (par injectivit\u00e9 de  $\mathcal{C}(\prod_{\alpha \in S_w} (N_\alpha(L) \cap N_0), \pi_B^w)$ ), on peut supposer  $i_2 = 0$  auquel cas il reste  $H^{i_1}(N_{1,w,\beta}, \pi_B^w)$  qui est de dimension finie car  $N_{1,w,\beta}$  est un pro- $p$ -groupe analytique compact et sans torsion et  $\pi_B^w$  est de dimension finie, cf. par exemple [\[Serre 1994, \u00a7I.4.5\]](#).

Supposons maintenant  $H^i(N_1/N_{j+1,0}^S, \mathcal{C}_{w,0}(\pi_B)^{N_{j+1,0}^S})$  de dimension finie pour un  $j \in \{0, \dots, m-1\}$  et tout entier  $i \geq 0$ , et montrons que  $H^i(N_1/N_{j,0}^S, \mathcal{C}_{w,0}(\pi_B)^{N_{j,0}^S})$

est de dimension finie pour tout entier  $i \geq 0$ . Par la suite spectrale de Hochschild–Serre appliquée à :

$$1 \rightarrow N_{j+1,0}^S/N_{j,0}^S \rightarrow N_1/N_{j,0}^S \rightarrow N_1/N_{j+1,0}^S \rightarrow 1,$$

il suffit de montrer que le  $k_E$ -espace vectoriel :

$$H^{i_1}(N_1/N_{j+1,0}^S, H^{i_2}(N_{j+1,0}^S/N_{j,0}^S, \mathcal{C}_{w,0}(\pi_B)^{N_{j,0}^S}))$$

est de dimension finie sur  $k_E$  pour tout couple d'entiers  $(i_1, i_2)$ . Supposons d'abord que  $\mathcal{C}_{w,0}(\pi_B)^{N_{j,0}^S}$  est une représentation injective de  $N_{j+1,0}^S/N_{j,0}^S$  (cf. le (ii) de la [proposition 8.4](#)), alors comme dans le cas précédent seul reste à considérer  $H^{i_1}(N_1/N_{j+1,0}^S, \mathcal{C}_{w,0}(\pi_B)^{N_{j+1,0}^S})$  (les autres cas étant nuls), qui est de dimension finie par hypothèse de récurrence. Supposons maintenant que  $N_{j+1,0}^S/N_{j,0}^S$  agit trivialement sur  $\mathcal{C}_{w,0}(\pi_B)^{N_{j,0}^S}$ . Alors on a un isomorphisme compatible à l'action de  $N_1/N_{j+1,0}^S$  :

$$H^{i_2}(N_{j+1,0}^S/N_{j,0}^S, \mathcal{C}_{w,0}(\pi_B)^{N_{j,0}^S}) \cong \mathcal{C}_{w,0}(\pi_B)^{N_{j,0}^S} \otimes_{k_E} H^{i_2}(N_{j+1,0}^S/N_{j,0}^S, k_E) \quad (51)$$

pour l'action usuelle de  $N_1/N_{j+1,0}^S$  sur :

$$\mathcal{C}_{w,0}(\pi_B)^{N_{j,0}^S} \cong \mathcal{C}_{w,0}(\pi_B)^{N_{j+1,0}^S}$$

(provenant de l'action par translation à droite) et l'action naturelle de  $N_1/N_{j+1,0}^S$  sur  $H^{i_2}(N_{j+1,0}^S/N_{j,0}^S, k_E)$  obtenue en voyant  $k_E$  comme représentation triviale de  $N_1/N_{j,0}^S$ . Comme  $N_{j+1,0}^S/N_{j,0}^S$  est un pro- $p$ -groupe analytique compact et sans torsion,  $H^{i_2}(N_{j+1,0}^S/N_{j,0}^S, k_E)$  est de dimension finie sur  $k_E$  ([[Serre 1994](#), §I.4.5]), et comme  $N_1/N_{j+1,0}^S$  est pro- $p$ -groupe, on voit que  $H^{i_2}(N_{j+1,0}^S/N_{j,0}^S, k_E)$  est une extension successive finie de représentations triviales de  $N_1/N_{j+1,0}^S$  sur  $k_E$ . Ainsi la représentation (51) de  $N_1/N_{j+1,0}^S$  est une extension successive finie de  $\mathcal{C}_{w,0}(\pi_B)^{N_{j+1,0}^S}$ . Par les suites exactes longues de cohomologie des groupes usuelles et un dévissage évident, il suffit donc de savoir que  $H^{i_1}(N_1/N_{j+1,0}^S, \mathcal{C}_{w,0}(\pi_B)^{N_{j+1,0}^S})$  est de dimension finie sur  $k_E$  pour tout  $i_1 \geq 0$ , ce qui est de nouveau l'hypothèse de récurrence.  $\square$

Par la [proposition 8.2](#), le (ii) du [théorème 8.1](#) découle du cas  $j = 0$  de la [proposition 8.5](#), ce qui achève la preuve du [théorème 8.1](#).

On a le corollaire suivant immédiat par le (iii) de la [proposition 2.7](#).

**Corollaire 8.6.** *Soit  $\pi_B$  une représentation lisse de  $T(L)$  sur  $A$ .*

(i) *On a  $D^\vee(H^i(N_1, \mathcal{C}_1(\pi_B))) = 0$  pour tout  $i \geq 1$ .*

(ii) *Si  $\pi_B$  est de plus localement admissible (comme représentation de  $T(L)$ ), on a  $D^\vee(H^i(N_1, \mathcal{C}_w(\pi_B))) = 0$  pour tout  $i \geq 0$  et tout  $w \in W \setminus \{1\}$ .*

**Remarque 8.7.** Des calculs ainsi que la [remarque 6.9](#) suggèrent que le [théorème 8.1](#) et le [corollaire 8.6](#) devraient se généraliser comme suit à tout sous-groupe parabolique  $P \subseteq G$  contenant  $B$  comme au [§ 3](#) : soit  $\pi_P$  une représentation lisse de  $L_P(L)$  sur  $A$ , alors on devrait avoir un isomorphisme dans la catégorie  $\widehat{\Phi}\Gamma_A^{\text{ét}}$  pour tout  $i \geq 1$  :

$$D^\vee(H^i(N_1, \mathcal{C}_1(\pi_P))) \stackrel{?}{\cong} D^\vee(H^i(N_{L_P,1}, \pi_P)),$$

et si  $\pi_P$  est de plus localement admissible (comme représentation de  $L_P(L)$ ), alors on devrait avoir que le  $A[F]$ -module  $H^i(N_1, \mathcal{C}_w(\pi_P))$  est de torsion pour tout  $i \geq 0$  et tout  $w \in K_P \setminus \{1\}$ , et donc dans ce cas  $D^\vee(H^i(N_1, \mathcal{C}_w(\pi_P))) \stackrel{?}{=} 0$ .

### 9. Quelques conséquences

On explicite quelques conséquences des résultats précédents, en particulier on en déduit la réponse à une question posée dans [\[Breuil et Herzig 2015\]](#).

On garde les notations des sections précédentes. On note  $\text{SP}_A$  la catégorie abélienne des représentations lisses de  $G(L)$  sur  $A$  de longueur finie dont les constituants irréductibles sont des sous-quotients de séries principales.

**Corollaire 9.1.** *Soit  $\pi$  un objet de  $\text{SP}_A$ .*

- (i) *Le  $A[[X]][F]$ -module  $\pi^{N_1}$  satisfait la propriété Ad de la [définition 2.2](#).*
- (ii) *Le  $A[F]$ -module  $H^i(N_1, \pi)$  est de torsion pour  $i \geq 1$ .*
- (iii) *On a  $D_\xi^\vee(\pi) \in \Phi\Gamma_A^{\text{ét}}$  (et pas seulement  $\widehat{\Phi}\Gamma_A^{\text{ét}}$ ).*

*Démonstration.* (i) Noter que  $\pi|_{B(L)}$  est encore de longueur finie comme représentation de  $B(L)$  par [\[Vignéras 2008, théorème 5\]](#). Par le (ii) du [lemme 2.5](#) et un dévissage, on se ramène à  $A = k_E$ . Si  $\pi_B$  est un caractère lisse de  $T(L)$  sur  $k_E$ , rappelons que la  $B(L)$ -représentation  $(\text{Ind}_{B^-(L)}^{G(L)} \pi_B)|_{B(L)}$  est de longueur finie et que ses constituants sont exactement les  $B(L)$ -représentations  $\mathcal{C}_w(\pi_B)$  du [§ 6](#) pour  $w \in W$ , cf. [\[Vignéras 2008, théorème 5\]](#). Par le (ii) du [lemme 2.5](#) et un dévissage sur les constituants de  $\pi|_{B(L)}$ , on se ramène ainsi à une  $B(L)$ -représentation  $\mathcal{C}_w(\pi_B)$ . Cela découle alors de la [proposition 6.8](#) et de la [proposition 7.7](#).

(ii) Par le (i) du [lemme 2.5](#) et un dévissage comme au (i), il suffit de démontrer l'énoncé pour  $A = k_E$  et  $\mathcal{C}_w(\pi_B)$  comme au (i), ce qui suit du [théorème 8.1](#).

(iii) Là encore, par le (ii) de la [proposition 2.7](#) et un dévissage, on se ramène à  $\mathcal{C}_w(\pi_B)$  comme au (i). Si  $w \neq 1$ , c'est clair par la [proposition 6.8](#). Si  $w = 1$ , cela résulte de [\(39\)](#) et [\(47\)](#) (cf. [Exemple 7.6](#)). □

**Corollaire 9.2.** *Soit  $0 \rightarrow \pi' \rightarrow \pi \rightarrow \pi'' \rightarrow 0$  une suite exacte courte de représentations lisses de  $G(L)$  sur  $A$  telle que  $\pi'$  est dans  $\text{SP}_A$ . Alors on a une suite exacte courte  $0 \rightarrow D_\xi^\vee(\pi'') \rightarrow D_\xi^\vee(\pi) \rightarrow D_\xi^\vee(\pi') \rightarrow 0$  dans  $\widehat{\Phi}\Gamma_A^{\text{ét}}$ .*

*Démonstration.* On a une suite exacte dans  $\text{Mod}_A$  :

$$0 \longrightarrow \pi'^{N_1} \longrightarrow \pi^{N_1} \longrightarrow \pi''^{N_1} \longrightarrow H^1(N_1, \pi').$$

Le  $A[[X]][[F]]$ -module  $\pi'^{N_1}$  satisfait la propriété Ad par le (i) du [corollaire 9.1](#) et  $H^1(N_1, \pi')$  est un  $A[F]$ -module de torsion par le (ii) du [corollaire 9.1](#). Par le (iv) de la [proposition 2.7](#), on en déduit le résultat.  $\square$

**Corollaire 9.3.** *En restriction à la catégorie  $\text{SP}_A$ , le foncteur  $D_\xi^\vee$  est exact et à valeurs dans  $\Phi\Gamma_A^{\text{ét}}$ .*

*Démonstration.* La première partie résulte du [corollaire 9.2](#) et la deuxième est le (iii) du [corollaire 9.1](#).  $\square$

**Remarque 9.4.** La preuve du [corollaire 9.3](#) reste la même en remplaçant  $\text{SP}_A$  par la catégorie abélienne  $C_A$  formée des représentations de  $G(L)$  de longueur finie sur  $A$  dont les constituants irréductibles  $\pi$  vérifient les 3 conditions : (1)  $\pi^{N_1}$  satisfait Ad, (2)  $H^1(N_1, \pi)$  est un  $A[F]$ -module de torsion, (3)  $D_\xi^\vee(\pi) \in \Phi\Gamma_A^{\text{ét}}$ . Il est vraisemblable que  $C_A$  contienne *strictement*  $\text{SP}_A$  au moins pour  $L = \mathbb{Q}_p$ . Par exemple on peut s'attendre à ce que les induites paraboliques irréductibles (sur  $k_E$  donc) ne faisant intervenir que des représentations (irréductibles) de  $\text{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$  ou des caractères de  $\mathbb{Q}_p^\times$  dans la représentation du Levi [[Abe 2013](#); [Herzig 2011](#)] vérifient (1) et (2) (elles vérifient (3) par le [théorème 6.1](#), la [proposition 5.5](#) et les résultats pour  $\text{GL}_2(\mathbb{Q}_p)$  [[Colmez 2010](#); [Emerton 2008](#); [Berger et Vienney 2014](#); [Colmez et al. 2014](#)]).

Considérons maintenant la catégorie abélienne  $\text{SP}_E$  des représentations continues unitaires de  $G(L)$  sur  $E$  topologiquement de longueur finie dont les constituants (topologiquement) irréductibles sont des sous-quotients de séries principales continues unitaires sur  $E$ . Alors le foncteur  $D_\xi^\vee$  s'étend en un foncteur contravariant et exact de  $\text{SP}_E$  dans la catégorie  $\Phi\Gamma_E^{\text{ét}}$  des  $(\varphi, \Gamma)$ -module étales usuels sur  $E$  en posant si  $\Pi$  est dans  $\text{SP}_E$  :

$$D_\xi^\vee(\Pi) \stackrel{\text{déf}}{=} E \otimes_{\mathcal{O}_E} \varprojlim_m D_\xi^\vee(\Pi^0/(\varpi_E^m))$$

où  $\Pi^0$  est une boule unité (quelconque) de  $\Pi$  stable par  $G(L)$  et où les flèches de transition (surjectives)  $D_\xi^\vee(\Pi^0/(\varpi_E^m)) \rightarrow D_\xi^\vee(\Pi^0/(\varpi_E^{m-1}))$  proviennent de :

$$\Pi^0/(\varpi_E^{m-1}) \hookrightarrow \Pi^0/(\varpi_E^m).$$

En utilisant les propriétés d'exactitude de  $D_\xi^\vee$ , on vérifie facilement que  $D_\xi^\vee(\Pi)$  ne dépend pas du choix de  $\Pi^0$ . Ces mêmes propriétés d'exactitude montrent que  $D_\xi^\vee(\Pi^0/(\varpi_E^m))$  est libre de rang fini (indépendant de  $m$ ) sur  $\mathcal{O}_E/(\varpi_E)^m[[X]][[1/X]]$  pour tout  $m$ .

Soit  $G'$  un autre groupe algébrique réductif connexe déployé sur  $L$  de centre connexe et soit  $D_{\xi'}^\vee, D_{\xi \oplus \xi'}^\vee$  comme au §5. On définit les catégories  $\mathrm{SP}'_E$  (resp.  $\mathrm{SP}''_E$ ) comme  $\mathrm{SP}_E$  mais avec le groupe  $G'$  (resp.  $G \times G'$ ) au lieu de  $G$ , auxquelles on étend  $D_{\xi'}^\vee$  (resp.  $D_{\xi \oplus \xi'}^\vee$ ) comme ci-dessus. Si  $(\Pi, \Pi') \in \mathrm{SP}_E \times \mathrm{SP}'_E$ , notons que  $\Pi \widehat{\otimes}_E \Pi'$  est aussi un objet de  $\mathrm{SP}''_E$  (cela se déduit aisément du fait que le produit tensoriel complété de deux séries principales continues unitaires de  $G(L)$  et  $G'(L)$  est une série principale continue unitaire de  $G(L) \times G'(L)$ ), de sorte que  $D_{\xi \oplus \xi'}^\vee(\Pi \widehat{\otimes}_E \Pi')$  est bien défini dans  $\Phi\Gamma_E^{\text{ét}}$ . On note de manière analogue à [Fontaine 1990, §A.2.2.1] :

$$\mathcal{E} \stackrel{\text{déf}}{=} E \otimes_{\mathcal{O}_E} \left( \varprojlim_m \mathcal{O}_E / (\varpi_E)^m \llbracket X \rrbracket \llbracket 1/X \rrbracket \right) \cong E \otimes_{\mathcal{O}_E} (\mathcal{O}_E \llbracket X \rrbracket \llbracket 1/X \rrbracket)^\wedge$$

muni des actions de  $\mathbb{Z}_p^\times$  et  $\varphi$  induites par celles sur  $\mathcal{O}_E / (\varpi_E)^m \llbracket X \rrbracket \llbracket 1/X \rrbracket$  pour tout  $m$ .

**Corollaire 9.5.** *Avec les notations précédentes, on a un isomorphisme dans  $\Phi\Gamma_E^{\text{ét}}$  :*

$$D_{\xi \oplus \xi'}^\vee(\Pi \widehat{\otimes}_E \Pi') \cong D_\xi^\vee(\Pi) \otimes_{\mathcal{E}} D_{\xi'}^\vee(\Pi').$$

*Démonstration.* Soit  $\Pi^0$  (resp.  $\Pi'^0$ ) une boule unité de  $\Pi$  (resp.  $\Pi'$ ) stable par  $G(L)$  (resp.  $G'(L)$ ), alors  $\Pi^0 \widehat{\otimes}_{\mathcal{O}_E} \Pi'^0$  est une boule unité de  $\Pi \widehat{\otimes}_E \Pi'$  stable par  $G(L) \otimes G'(L)$  et par définition :

$$D_{\xi \oplus \xi'}^\vee(\Pi \widehat{\otimes}_E \Pi') = E \otimes_{\mathcal{O}_E} \varprojlim_m D_{\xi \oplus \xi'}^\vee(\Pi^0 / (\varpi_E^m) \otimes_{\mathcal{O}_E} \Pi'^0 / (\varpi_E^m)).$$

Comme on a :

$$D_\xi^\vee(\pi) \otimes_{\mathcal{E}} D_{\xi'}^\vee(\pi') \cong E \otimes_{\mathcal{O}_E} \varprojlim_m (D_\xi^\vee(\Pi^0 / (\varpi_E^m)) \otimes_{\mathcal{O}_E \llbracket X \rrbracket \llbracket 1/X \rrbracket} D_{\xi'}^\vee(\Pi'^0 / (\varpi_E^m))),$$

il suffit de montrer que pour tout  $m$  :

$$D_{\xi \oplus \xi'}^\vee(\Pi^0 / (\varpi_E^m) \otimes_{\mathcal{O}_E} \Pi'^0 / (\varpi_E^m)) \cong D_\xi^\vee(\Pi^0 / (\varpi_E^m)) \otimes_{\mathcal{O}_E \llbracket X \rrbracket \llbracket 1/X \rrbracket} D_{\xi'}^\vee(\Pi'^0 / (\varpi_E^m))$$

ce qui découle de la proposition 5.5, que l'on peut appliquer grâce au (i) du corollaire 9.1 (notons que les  $\mathcal{O}_E / (\varpi_E)^m$ -modules sous-jacents à  $\Pi^0 / (\varpi_E^m)$  et  $\Pi'^0 / (\varpi_E^m)$  sont bien libres, une base s'obtenant en relevant une base quelconque de  $\Pi^0 / (\varpi_E)$  et  $\Pi'^0 / (\varpi_E)$ ).  $\square$

**Remarque 9.6.** Par le (i) de la remarque 5.6, la même preuve donne une version du corollaire 9.5 avec un nombre fini quelconque de représentations.

On a aussi une version  $p$ -adique du théorème 6.1 dont la preuve, sans difficulté, est laissée au lecteur.

**Corollaire 9.7.** *Soit  $\pi_p$  une représentation continue unitaire de  $L_p(L)$  sur  $E$  topologiquement de longueur finie dont les constituants irréductibles sont des sous-quotients de séries principales continues unitaires de  $L_p(L)$ , et soit  $(\mathrm{Ind}_{p^-(L)}^{G(L)} \pi_p)^{c^0}$*

*l'induite parabolique continue unitaire de  $\pi_P$ . On a un isomorphisme dans  $\Phi\Gamma_E^{\text{ét}}$  fonctoriel en  $\pi_P$  :*

$$D_\xi^\vee((\text{Ind}_{P^-(L)}^{G(L)} \pi_P)^{C^0}) \cong D_\xi^\vee(\pi_P).$$

(Notons que, par induction “par étages”, la représentation  $(\text{Ind}_{P^-(L)}^{G(L)} \pi_P)^{C^0}$  est bien dans la catégorie  $\text{SP}_E$ .)

Nous pouvons maintenant répondre de manière significative (et positive) à une question formulée dans [Breuil et Herzig 2015, §3.5]. Nous devons rappeler pour cela plusieurs notations, définitions et constructions de [loc. cit.]. On suppose désormais  $L = \mathbb{Q}_p$  (comme dans [loc. cit.]).

On note  $(G, B, T)$ ,  $(X(T), R, X^\vee(T), R^\vee)$ , etc. comme au début du § 3. On suppose  $G$  de centre connexe, on fixe des cocaractères fondamentaux  $\lambda_{\alpha^\vee} : \mathbb{G}_m \rightarrow T$  pour  $\alpha \in S$  et on pose  $\xi \stackrel{\text{déf}}{=} \sum_{\alpha \in S} \lambda_{\alpha^\vee} \in X^\vee(T)$  comme au § 3. La donnée radicielle duale  $(X^\vee(T), R^\vee, X(T), R)$  est associée à  $(\widehat{G}, \widehat{B}, \widehat{T})$  où  $\widehat{G}$  est le groupe réductif déployé sur  $\mathbb{Q}_p$  dual de  $G$ ,  $\widehat{B}$  le Borel associé à  $(R^\vee)^+$  et  $\widehat{T} \subseteq \widehat{B}$  le tore maximal (tel que  $X(\widehat{T}) \cong X^\vee(T)$ ). On note  $\widehat{N}$  le radical unipotent de  $\widehat{B}$  et  $\widehat{N}_\alpha \subseteq \widehat{N}$  le sous-groupe radiciel associé à  $\alpha \in (R^\vee)^+$ . On suppose que  $\widehat{G}$  est aussi de centre connexe, en particulier il existe un caractère  $\theta \in X(T)$  tel que  $\theta \circ \alpha^\vee = \text{Id}_{\mathbb{G}_m}$  pour tout  $\alpha \in S$  [Breuil et Herzig 2015, Proposition 2.1.1]. On rappelle qu’à tout sous-ensemble  $C \subseteq (R^\vee)^+$  clos (i.e., tel que  $\alpha, \beta \in C$  et  $\alpha + \beta \in (R^\vee)^+ \Rightarrow \alpha + \beta \in C$ ) est associé un sous-groupe algébrique fermé  $\widehat{B}_C$  de  $\widehat{B}$  (resp.  $\widehat{G}_C$  de  $\widehat{G}$ ) sur  $\mathbb{Q}_p$  engendré par  $\widehat{T}$  et les  $\widehat{N}_\alpha$  (resp.  $\widehat{T}$  et les  $\widehat{N}_\alpha, \widehat{N}_{-\alpha}$ ) pour  $\alpha \in C$ . De plus tout sous-groupe algébrique fermé de  $\widehat{B}$  contenant  $\widehat{T}$  est de la forme  $\widehat{B}_C$ .

Soit  $\rho : \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p) \rightarrow \widehat{B}(E) \subseteq \widehat{G}(E)$  un homomorphisme continu et :

$$\widehat{\chi}_\rho : \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p) \xrightarrow{\rho} \widehat{B}(E) \twoheadrightarrow \widehat{T}(E).$$

On suppose  $\alpha^\vee \circ \widehat{\chi}_\rho \notin \{1, \varepsilon^{\pm 1}\}$  pour tout  $\alpha \in R^+$ , i.e.,  $\rho$  est générique au sens de [loc. cit., Definition 3.3.1]. On note  $C_\rho \subseteq (R^\vee)^+$  le plus petit sous-ensemble clos tel que  $\rho$  est à valeurs dans  $\widehat{B}_{C_\rho}(E) \subseteq \widehat{B}(E)$ . Quitte à remplacer  $\rho$  par un conjugué dans  $\widehat{B}(E)$ , on suppose de plus  $C_\rho$  minimal parmi tous les conjugués de  $\rho$  dans  $\widehat{B}(E)$  (cf. [Breuil et Herzig 2015, §3.2]). On pose :

$$W_{C_\rho} \stackrel{\text{déf}}{=} \{w \in W, w^{-1}(C_\rho) \subseteq (R^\vee)^+\}.$$

Si  $w \in W_{C_\rho}$  et  $I \subseteq w(S^\vee) \cap C_\rho$  est un sous-ensemble de racines deux à deux orthogonales, alors  $I$  et  $C_\rho \setminus I$  sont des sous-ensembles clos de  $(R^\vee)^+$  [loc. cit., Lemma 2.3.7] et  $\widehat{B}_{C_\rho}$  est un produit semi-direct  $\widehat{N}_{C_\rho \setminus I} \rtimes \widehat{B}_I$  où :

$$\widehat{N}_{C_\rho \setminus I} \cong \prod_{\alpha \in C_\rho \setminus I} \widehat{N}_\alpha$$

est le radical unipotent de  $\widehat{B}_{C_\rho \setminus I}$ . De plus  $\widehat{B}_I$  est isomorphe à  $\widehat{T}_I \times (\prod_{\alpha \in I} \widehat{B}_\alpha)$  où  $\widehat{T}_I \subseteq \widehat{T}$  est un sous-tore central dans  $\widehat{B}_I$  tel que  $\widehat{T} \cong \widehat{T}_I \times (\prod_{\alpha \in I} \widehat{T}_\alpha)$ ,  $\widehat{T}_\alpha$  (resp.  $\widehat{B}_\alpha$ ) étant un tore déployé (resp. un sous-groupe de Borel contenant  $\widehat{T}_\alpha$ ) de la copie de  $GL_2$  dans  $\widehat{G}$  correspondant à la racine  $\alpha$ , cf. [loc. cit., §2.3]. Soit  $w \in W_{C_\rho}$  et  $\alpha \in w(S^\vee) \cap C_\rho$ , en utilisant la minimalité de  $C_\rho$ , on voit que la représentation :

$$\rho_\alpha : \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p) \xrightarrow{\rho} \widehat{B}_{C_\rho}(E) \twoheadrightarrow \widehat{B}_\alpha(E)$$

est non scindée (i.e., n'est pas à valeurs dans  $\widehat{T}_\alpha(E)$  à conjugaison près dans  $\widehat{B}_\alpha(E)$ ) et est générique.

On note  $L^\otimes \stackrel{\text{déf}}{=} \otimes_{\alpha \in S} L(\lambda_{\alpha^\vee})$  (une représentation algébrique de  $\widehat{G}$  sur  $E$ ) où  $L(\lambda_{\alpha^\vee})$  est la représentation algébrique de  $\widehat{G}$  sur  $E$  de plus haut poids (dominant)  $\lambda_{\alpha^\vee}$  relativement à  $\widehat{B}$  (cf. [loc. cit., §2.1], on utilise ici  $X^\vee(T) \cong X(\widehat{T})$ ). On note  $(L^\otimes|_{\widehat{B}_{C_\rho}})^{\text{ord}}$  la plus grande sous-représentation algébrique de  $L^\otimes|_{\widehat{B}_{C_\rho}}$  dont les poids (dans  $X(\widehat{T})$ ) sont dans  $\{w(\xi), w \in W\}$  en voyant  $\xi$  dans  $X(\widehat{T})$ . Pour suivre les notations de [loc. cit., §2], on écrit plutôt  $\alpha$  au lieu de  $\alpha^\vee$ , par exemple  $L^\otimes = \otimes_{\alpha \in S^\vee} L(\lambda_\alpha)$ . Si  $w \in W_{C_\rho}$  et  $I \subseteq w(S^\vee) \cap C_\rho$  est un sous-ensemble de racines deux à deux orthogonales, on considère la représentation algébrique de  $\widehat{B}_I \cong \widehat{T}_I \times (\prod_{\alpha \in I} \widehat{B}_\alpha)$  sur  $E$  :

$$L_I \stackrel{\text{déf}}{=} w(\xi)|_{\widehat{T}_I} \otimes_E \left( \bigotimes_{\alpha \in I} L_\alpha \right)$$

où  $L_\alpha$  est la restriction à  $\widehat{B}_\alpha$  de la représentation algébrique de  $GL_2$  sur  $E$  de plus haut poids  $w(\xi)|_{\widehat{T}_\alpha}$  relativement à  $\widehat{B}_\alpha$ . En fait  $L_\alpha$  a dimension 2 et est l'unique extension non scindée du poids  $s_\alpha(w(\xi)|_{\widehat{T}_\alpha})$  par le poids  $w(\xi)|_{\widehat{T}_\alpha}$  où  $s_\alpha \in W$  est la permutation associée à  $\alpha$  (voir [loc. cit., §2.3]). On voit  $L_I$  comme représentation algébrique de  $\widehat{B}_{C_\rho}$  via  $\widehat{B}_{C_\rho} \twoheadrightarrow \widehat{B}_I$ . Si  $I \subseteq I'$ , on a une unique injection  $L_I \hookrightarrow L_{I'}$  ce qui permet de définir (à isomorphisme près) la représentation algébrique  $L_{C_\rho, w} \stackrel{\text{déf}}{=} \varinjlim I$  de  $\widehat{B}_{C_\rho}$  sur  $E$  où la limite inductive est prise sur les sous-ensembles  $I$  de  $w(S^\vee) \cap C_\rho$  de racines deux à deux orthogonales. Alors on a un isomorphisme de représentations algébriques de  $\widehat{B}_{C_\rho}$  sur  $E$  ([Breuil et Herzig 2015, Theorem 2.4.1]) :

$$\bigoplus_{w \in W_{C_\rho}} L_{C_\rho, w} \cong (L^\otimes|_{\widehat{B}_{C_\rho}})^{\text{ord}}.$$

Si l'on note  $\widehat{\chi}_{\rho_I}$  l'image de  $\widehat{\chi}_\rho$  via la surjection  $\widehat{T}(E) \twoheadrightarrow \widehat{T}_I(E)$ , on dispose aussi de la représentation de  $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p)$  sur  $E$  :

$$L_I \circ \rho \cong (w(\xi)|_{\widehat{T}_I} \circ \widehat{\chi}_{\rho_I}) \otimes_E \left( \bigotimes_{\alpha \in I} L_\alpha \circ \rho_\alpha \right). \tag{52}$$

À  $\rho$  comme ci-dessus est par ailleurs associée dans [loc. cit., §3.3] une représentation dans  $SP_E$  notée  $\Pi(\rho)^{\text{ord}}$  dont on rappelle la définition. C'est une somme directe  $\Pi(\rho)^{\text{ord}} = \bigoplus_{w \in W_{C_\rho}} \Pi(\rho)_{C_\rho, w}$  où  $\Pi(\rho)_{C_\rho, w}$  est défini comme suit.

Soit  $w \in W_{C_\rho}$  et  $J \subseteq S$  un sous-ensemble de racines simples deux à deux orthogonales tel que  $w(J) \subseteq C_\rho^\vee$  où  $C_\rho^\vee \stackrel{\text{déf}}{=} \{\alpha^\vee, \alpha \in C_\rho\} \subseteq R^+$ . Dans ce cas  $G_J$  est le sous-groupe de Levi du parabolique  $B^-G_J$  de  $G$  et est isomorphe à  $T_J \times \text{GL}_2^J$  où  $T_J \subseteq T$  est un sous-tore central dans  $G_J$  tel que  $T \cong T_J \times (\prod_{\alpha \in J} T_\alpha)$ ,  $T_\alpha$  étant un tore déployé de la copie de  $\text{GL}_2$  dans  $G$  correspondant à la racine  $\alpha$ , cf. [loc. cit., Lemma 3.1.4]. On choisit cette décomposition de telle sorte que  $\widehat{T}_{w(J)^\vee}$  (cf. ci-dessus) (resp.  $\widehat{T}_{w(\alpha)^\vee}$ ,  $\alpha \in J$ ) soit le dual de  $wT_Jw^{-1} \subseteq wTw^{-1} \cong T$  (resp. de  $wT_\alpha w^{-1}$ ) où  $w(J)^\vee \stackrel{\text{déf}}{=} \{w(\alpha)^\vee, \alpha \in J\} \subseteq w(S^\vee) \cap C_\rho$ . Notons que  $B \cap G_J = T_J \times (\prod_{\alpha \in J} B_\alpha)$  où  $B_\alpha \subset \text{GL}_2$  est un sous-groupe de Borel contenant  $T_\alpha$ . Si  $\alpha \in J$  et  $\chi_\alpha : T_\alpha(\mathbb{Q}_p) \rightarrow \mathcal{O}_E^\times \subset E^\times$  est un caractère continu unitaire, on pose avec les notations de [loc. cit., §3.1] (série principale continue unitaire) :

$$\Pi_\alpha(\chi_\alpha) \stackrel{\text{déf}}{=} \left( \text{Ind}_{B_\alpha^-(\mathbb{Q}_p)}^{\text{GL}_2(\mathbb{Q}_p)} (\chi_\alpha \cdot (\varepsilon^{-1} \circ \theta)|_{T_\alpha(\mathbb{Q}_p)}) \right)^{C^0}.$$

Soit  $\chi_\rho : T(\mathbb{Q}_p) \rightarrow \mathcal{O}_E^\times \subset E^\times$  le caractère continu (unitaire) correspondant à  $\widehat{\chi}_\rho$  par la correspondance de Langlands pour les tores (cf. par exemple [loc. cit., (10)]). Pour  $\alpha \in S$  on note  $\mathcal{E}_\alpha$  l'unique extension non scindée de  $\Pi_\alpha(s_\alpha(w^{-1}(\chi_\rho)|_{T_\alpha(\mathbb{Q}_p)}))$  par  $\Pi_\alpha(w^{-1}(\chi_\rho)|_{T_\alpha(\mathbb{Q}_p)})$  (cf. [loc. cit., Appendix B] pour des références) et on considère l'induite parabolique continue :

$$\Pi(\rho)_J \stackrel{\text{déf}}{=} \left( \text{Ind}_{B^-(\mathbb{Q}_p)G_J(\mathbb{Q}_p)}^{G(\mathbb{Q}_p)} ((w^{-1}(\chi_\rho) \cdot (\varepsilon^{-1} \circ \theta))|_{T_J(\mathbb{Q}_p)} \otimes_E (\otimes_{\alpha \in J} \mathcal{E}_\alpha)) \right)^{C^0}.$$

Pour  $J \subseteq J'$  comme ci-dessus, on a une unique injection  $G(\mathbb{Q}_p)$ -équivariante  $\Pi(\rho)_J \hookrightarrow \Pi(\rho)_{J'}$  à scalaire près [loc. cit., §3.3] et on pose  $\Pi(\rho)_{C_\rho, w} \stackrel{\text{déf}}{=} \varinjlim \Pi(\rho)_J$  où la limite inductive est prise sur les sous-ensembles  $J$  de  $S \cap w^{-1}(C_\rho^\vee)$  de racines deux à deux orthogonales. Il est clair que  $\Pi(\rho)_{C_\rho, w}$  est dans  $\text{SP}_E$  (en fait  $\Pi(\rho)_{C_\rho, w}$  admet une suite de composition formée de séries principales “complètes”, cf. [loc. cit., §3.3]).

Dans [Breuil et Herzig 2015, §3.5], on demande s'il existe un foncteur covariant noté  $F$  de la catégorie des représentations continues unitaires admissibles (topologiquement) de longueur finie de  $G(\mathbb{Q}_p)$  sur  $E$  dans la catégorie  $\text{Rep}_E$  des représentations continues de dimension finie de  $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p)$  sur  $E$  vérifiant les trois propriétés suivantes :

(i) pour tout caractère continu unitaire  $\chi : T(\mathbb{Q}_p) \rightarrow \mathcal{O}_E^\times \subset E^\times$  on a :

$$F\left(\left(\text{Ind}_{B^-(\mathbb{Q}_p)}^{G(\mathbb{Q}_p)} \chi \cdot (\varepsilon^{-1} \circ \theta)\right)^{C^0}\right) = \xi \circ \widehat{\chi},$$

où  $\widehat{\chi} : \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p) \rightarrow \widehat{T}(E)$  correspond à  $\chi$  par la correspondance de Langlands pour les tores et où on voit  $\xi$  dans  $X(\widehat{T})$  ;

(ii)  $F$  est exact lorsque restreint à la catégorie  $\text{SP}_E$  ;

(iii)  $F(\Pi(\rho)^{\text{ord}}) = (L^\otimes|_{\widehat{B}_{C_\rho}})^{\text{ord}} \circ \rho$ .

Alternativement (i) est équivalent via la réciprocité locale à :

$$F((\text{Ind}_{B^-(\mathbb{Q}_p)}^{G(\mathbb{Q}_p)} \chi \cdot (\varepsilon^{-1} \circ \theta))^{C^0}) = (x \mapsto \chi(\xi(x)))$$

où  $x \in \mathbb{Q}_p^\times$ . Notons que la définition de  $\Pi(\rho)^{\text{ord}}$  ne dépend pas de  $\xi$ , mais comme celle de  $L^\otimes$  en dépend (via les  $\lambda_{\alpha^\vee}$ ), on s'attend par (i) et (iii) à ce que  $\xi$  intervienne aussi dans la définition d'un tel foncteur  $F$ .

Notons  $V^\vee$  le foncteur contravariant de  $\Phi\Gamma_E^{\acute{e}t}$  dans la catégorie  $\text{Rep}_E$  défini comme le *dual* du foncteur covariant  $V_E$  de [Fontaine 1990, §A.3.4.4(c)]. Soit  $\delta : \mathbb{Q}_p^\times \rightarrow \mathcal{O}_E^\times \subset E^\times$ ,  $x \mapsto \varepsilon^{-1}(\theta(\xi(x))) = \delta(x)$  que l'on voit comme caractère de  $\text{Gal}(\mathbb{Q}_p/\mathbb{Q}_p)$  (une puissance de  $\varepsilon$  donc). Le corollaire suivant montre que, au moins lorsque l'on se restreint à la catégorie  $\text{SP}_E$  (qui suffit pour exprimer les propriétés (i) à (iii) ci-dessus), un tel foncteur  $F$  existe bien.

**Corollaire 9.8.** *Le foncteur  $F \stackrel{\text{déf}}{=} (V^\vee \circ D_\xi^\vee) \otimes \delta^{-1}$  de la catégorie  $\text{SP}_E$  dans la catégorie  $\text{Rep}_E$  satisfait les propriétés (i), (ii) et (iii) ci-dessus.*

*Démonstration.* La propriété (i) découle du corollaire 9.7 et des définitions (cf. Exemple 7.6). La propriété (ii) suit du corollaire 9.3 (cf. la discussion qui suit la remarque 9.4). Montrons la propriété (iii). Soit  $w \in W_{C_\rho}$  et  $J \subseteq S \cap w^{-1}(C_\rho^\vee)$  un sous-ensemble de racines deux à deux orthogonales. Par le corollaire 9.7 appliqué avec  $L = \mathbb{Q}_p$ ,  $P = BG_J$  et :

$$\pi_P \stackrel{\text{déf}}{=} (w^{-1}(\chi_\rho) \cdot (\varepsilon^{-1} \circ \theta))|_{T_J(\mathbb{Q}_p)} \otimes_E (\otimes_{\alpha \in J} \mathcal{E}_\alpha),$$

et par le corollaire 9.5 (avec la remarque 9.6), on a dans  $\Phi\Gamma_E^{\acute{e}t}$  :

$$D_\xi^\vee(\Pi(\rho)_J) = D_{\xi_J}^\vee((w^{-1}(\chi_\rho) \cdot (\varepsilon^{-1} \circ \theta))|_{T_J(\mathbb{Q}_p)}) \otimes_{\mathcal{E}} (\otimes_{\alpha \in J} D_{\xi_\alpha}^\vee(\mathcal{E}_\alpha)) \quad (53)$$

où  $\xi_J$  (resp.  $\xi_\alpha$ ) est la composée  $\mathbb{G}_m \xrightarrow{\xi} T \rightarrow T_J$  (resp.  $\mathbb{G}_m \xrightarrow{\xi} T \rightarrow T_\alpha$ ). Par définition de  $D_{\xi_J}^\vee$  (cf. §3 et le lemme 7.5), on a (en voyant  $T_J(\mathbb{Q}_p)$  comme facteur direct de  $T(\mathbb{Q}_p)$  et via la réciprocité locale) :

$$\begin{aligned} V^\vee(D_{\xi_J}^\vee((w^{-1}(\chi_\rho) \cdot (\varepsilon^{-1} \circ \theta))|_{T_J(\mathbb{Q}_p)})) &= (x \mapsto (w^{-1}(\chi_\rho) \cdot (\varepsilon^{-1} \circ \theta))(\xi_J(x))) \\ &= (x \mapsto w^{-1}(\chi_\rho)(\xi_J(x))) \otimes \delta_J \end{aligned}$$

où  $x \in \mathbb{Q}_p^\times$  et  $\delta_J$  est le caractère de  $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p)$  induit par  $x \mapsto \varepsilon^{-1}(\theta(\xi_J(x)))$ . Mais le caractère de  $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p)$  induit par  $x \mapsto w^{-1}(\chi_\rho)(\xi_J(x))$  est exactement le caractère  $w(\xi)|_{\widehat{T}_{w(J)^\vee}} \circ \widehat{\chi}_{\rho_{w(J)^\vee}}$  (en suivant les définitions et en voyant maintenant  $\xi$  dans  $X(\widehat{T})$ ). De même, si  $\alpha \in J$  et si  $\delta_\alpha$  est le caractère de  $\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p)$  induit par  $x \mapsto \varepsilon^{-1}(\theta(\xi_\alpha(x)))$  (en voyant  $T_\alpha(\mathbb{Q}_p)$  comme facteur direct de  $T(\mathbb{Q}_p)$ ), on a :

$$V^\vee(D_{\xi_\alpha}^\vee(\mathcal{E}_\alpha)) \cong (L_{w(\alpha)^\vee} \circ \rho_{w(\alpha)^\vee}) \otimes \delta_\alpha$$

car, par généralité de  $\rho_{w(\alpha)^\vee}$ , par [Colmez 2010] (voir aussi [Colmez et al. 2014]) avec le (iii) de la proposition 3.2 (et un passage à la limite projective évident) et

par la propriété (i),  $V^\vee(D_{\xi_\alpha}^\vee(\mathcal{E}_\alpha)) \otimes \delta_\alpha^{-1}$  est l'unique extension non scindée de :

$$\begin{aligned} (x \mapsto s_\alpha w^{-1}(\chi_\rho)(\xi_\alpha(x))) &= (ws_\alpha(\xi))|_{\widehat{T}_{w(\alpha)^\vee}} \circ \widehat{\chi}_{\rho_{w(\alpha)^\vee}} \\ &= s_{w(\alpha)^\vee}(w(\xi))|_{\widehat{T}_{w(\alpha)^\vee}} \circ \widehat{\chi}_{\rho_{w(\alpha)^\vee}} \end{aligned}$$

par  $(x \mapsto w^{-1}(\chi_\rho)(\xi_\alpha(x))) = w(\xi)|_{\widehat{T}_{w(\alpha)^\vee}} \circ \widehat{\chi}_{\rho_{w(\alpha)^\vee}}$ . Comme  $V^\vee$  commute aux produits tensoriels, on en déduit avec (52), (53) et l'égalité  $\delta_J \prod_{\alpha \in J} \delta_\alpha = \delta$  que  $F(\Pi(\rho)_J) = L_{w(J)^\vee} \circ \rho$ . Par passage à la limite inductive sur  $J$  et exactitude de  $F$ , on obtient facilement  $F(\Pi(\rho)_{C_{\rho,w}}) = L_{C_{\rho,w}} \circ \rho$  d'où la propriété (iii) en sommant sur  $w \in W_{C_\rho}$ .  $\square$

**Remarque 9.9.** Par une preuve totalement analogue (dont on laisse les détails au lecteur intéressé), lorsque  $p$  est un bon premier pour  $\widehat{G}$  au sens de [Breuil et Herzig 2015, Définition 2.5.1], on montre une version sur  $k_E$  du corollaire 9.8 (comme espéré à la fin de [Breuil et Herzig 2015, §3.5]).

## Bibliographie

- [Abe 2013] N. Abe, “On a classification of irreducible admissible modulo  $p$  representations of a  $p$ -adic split reductive group”, *Compos. Math.* **149**:12 (2013), 2139–2168. MR 3143708 Zbl 06250165
- [Bergdall et Chojecki 2014] J. Bergdall et P. Chojecki, “Ordinary representations and companion points for  $U(3)$  in the indecomposable case”, prépublication, 2014, Voir <http://arxiv.org/abs/1405.3026>. arXiv 1405.3026
- [Berger et Vienney 2014] L. Berger et M. Vienney, “Irreducible modular representations of the Borel subgroup of  $GL_2(\mathbb{Q}_p)$ ”, pp. 32–51 dans *Automorphic Forms and Galois Representations*, vol. 1, édité par F. Diamond et al., London Math. Soc. Lecture Note Series **414**, Cambridge University Press, 2014.
- [Breuil 2003] C. Breuil, “Sur quelques représentations modulaires et  $p$ -adiques de  $GL_2(\mathbb{Q}_p)$ : I”, *Compositio Math.* **138**:2 (2003), 165–188. MR 2004k:11062 Zbl 1044.11041
- [Breuil et Herzig 2015] C. Breuil et F. Herzig, “Ordinary representations of  $G(\mathbb{Q}_p)$  and fundamental algebraic representations”, *Duke Math. J.* **164**:7 (2015), 1271–1352. MR 3347316 Zbl 06455742
- [Breuil et Paškūnas 2012] C. Breuil et V. Paškūnas, *Towards a modulo  $p$  Langlands correspondence for  $GL_2$* , vol. 216, Mem. Amer. Math. Soc. **1016**, 2012. MR 2931521 Zbl 1245.22010
- [Colmez 2010] P. Colmez, “Représentations de  $GL_2(\mathbb{Q}_p)$  et  $(\phi, \Gamma)$ -modules”, pp. 281–509 dans *Représentations  $p$ -adiques de groupes  $p$ -adiques II : Représentations de  $GL_2(\mathbb{Q}_p)$  et  $(\phi, \Gamma)$ -modules*, édité par L. Berger et al., Astérisque **330**, 2010. MR 2011j:11224 Zbl 1218.11107
- [Colmez et al. 2014] P. Colmez, G. Dospinescu et V. Paškūnas, “The  $p$ -adic local Langlands correspondence for  $GL_2(\mathbb{Q}_p)$ ”, *Camb. J. Math.* **2**:1 (2014), 1–47. MR 3272011 Zbl 1312.11090
- [Digne et Michel 1991] F. Digne et J. Michel, *Representations of finite groups of Lie type*, London Mathematical Society Student Texts **21**, Cambridge University Press, 1991. MR 92g:20063 Zbl 0815.20014
- [Emerton 2008] M. Emerton, “On a class of coherent rings, with applications to the smooth representation theory of  $GL_2(\mathbb{Q}_p)$  in characteristic  $p$ ”, prépublication, 2008, Voir <http://wvii-w.claymath.org/sites/default/files/emerton.pdf>.

- [Emerton 2010] M. Emerton, “Ordinary parts of admissible representations of  $p$ -adic reductive groups I. Definition and first properties”, pp. 355–402 dans  *$p$ -adic representations of  $p$ -adic groups III : Global and geometrical methods*, Astérisque **331**, 2010. [MR 2011k:22013](#) [Zbl 1205.22013](#)
- [Erdélyi et Zábrádi 2014] M. Erdélyi et G. Zábrádi, “Links between generalized Montréal-functors”, prépublication, 2014. [arXiv 1412.5778](#)
- [Fontaine 1990] J.-M. Fontaine, “Représentations  $p$ -adiques des corps locaux (1<sup>ère</sup> partie)”, pp. 249–309 dans *The Grothendieck Festschrift*, vol. II, édité par P. Cartier et al., Progr. Math. **87**, Birkhäuser, Boston, 1990. [MR 92i:11125](#) [Zbl 0743.11066](#)
- [Gabriel 1962] P. Gabriel, “Des catégories abéliennes”, *Bull. Soc. Math. France* **90** (1962), 323–448. [MR 38 #1144](#) [Zbl 0201.35602](#)
- [Hauseux 2014] J. Hauseux, “Extensions entre séries principales  $p$ -adiques et modulo  $p$  de  $G(F)$ ”, *J. Inst. Math. Jussieu* (publié en ligne août 2014).
- [Herzig 2011] F. Herzig, “The classification of irreducible admissible mod  $p$  representations of a  $p$ -adic  $GL_n$ ”, *Invent. Math.* **186**:2 (2011), 373–434. [MR 2845621](#) [Zbl 1235.22030](#)
- [Jantzen 2003] J. C. Jantzen, *Representations of algebraic groups*, 2<sup>nd</sup> éd., Mathematical Surveys and Monographs **107**, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2003. [MR 2004h:20061](#) [Zbl 1034.20041](#)
- [Morra et Schraen  $\geq$  2015] S. Morra et B. Schraen, “Structure partielle de certaines représentations supersingulières de  $GL_2$ ”, en préparation.
- [Ollivier 2014] R. Ollivier, “Resolutions for principal series representations of  $p$ -adic  $GL_n$ ”, *Münster J. Math.* **7** (2014), 225–240. [MR 3271245](#) [Zbl 1316.22015](#)
- [Schneider et Vignéras 2011] P. Schneider et M.-F. Vignéras, “A functor from smooth  $\mathfrak{o}$ -torsion representations to  $(\varphi, \Gamma)$ -modules”, pp. 525–601 dans *On certain  $L$ -functions*, édité par J. Arthur et al., Clay Math. Proc. **13**, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2011. [MR 2012e:11194](#) [Zbl 1278.11061](#)
- [Schraen 2012–14] B. Schraen, communications personnelles, novembre 2012 et mars 2014.
- [Schraen 2015] B. Schraen, “Sur la présentation des représentations supersingulières de  $GL_2(F)$ ”, *J. Reine Angew. Math.* **704** (2015), 187–208. [MR 3365778](#) [Zbl 06455996](#)
- [Serre 1994] J.-P. Serre, *Cohomologie galoisienne*, 5<sup>th</sup> éd., Lecture Notes in Mathematics **5**, Springer, Berlin, 1994. [MR 96b:12010](#) [Zbl 0812.12002](#)
- [Vignéras 2008] M.-F. Vignéras, “Série principale modulo  $p$  de groupes réductifs  $p$ -adiques”, *Geom. Funct. Anal.* **17**:6 (2008), 2090–2112. [MR 2009a:22015](#) [Zbl 05275302](#)
- [Zábrádi 2011] G. Zábrádi, “Exactness of the reduction on étale modules”, *J. Algebra* **331** (2011), 400–415. [MR 2012c:11253](#) [Zbl 1227.22022](#)

Communicated by Brian Conrad

Received 2014-09-06

Revised 2015-06-12

Accepted 2015-08-08

[christophe.breuil@math.u-psud.fr](mailto:christophe.breuil@math.u-psud.fr) *C.N.R.S. et Université Paris-Sud, Bâtiment 425,  
91405 Orsay Orsay, France*

# Algebra & Number Theory

[msp.org/ant](http://msp.org/ant)

## EDITORS

### MANAGING EDITOR

Bjorn Poonen  
Massachusetts Institute of Technology  
Cambridge, USA

### EDITORIAL BOARD CHAIR

David Eisenbud  
University of California  
Berkeley, USA

## BOARD OF EDITORS

Georgia Benkart	University of Wisconsin, Madison, USA	Susan Montgomery	University of Southern California, USA
Dave Benson	University of Aberdeen, Scotland	Shigefumi Mori	RIMS, Kyoto University, Japan
Richard E. Borcherds	University of California, Berkeley, USA	Raman Parimala	Emory University, USA
John H. Coates	University of Cambridge, UK	Jonathan Pila	University of Oxford, UK
J-L. Colliot-Thélène	CNRS, Université Paris-Sud, France	Anand Pillay	University of Notre Dame, USA
Brian D. Conrad	Stanford University, USA	Victor Reiner	University of Minnesota, USA
Hélène Esnault	Freie Universität Berlin, Germany	Peter Sarnak	Princeton University, USA
Hubert Flenner	Ruhr-Universität, Germany	Joseph H. Silverman	Brown University, USA
Sergey Fomin	University of Michigan, USA	Michael Singer	North Carolina State University, USA
Edward Frenkel	University of California, Berkeley, USA	Vasudevan Srinivas	Tata Inst. of Fund. Research, India
Andrew Granville	Université de Montréal, Canada	J. Toby Stafford	University of Michigan, USA
Joseph Gubeladze	San Francisco State University, USA	Ravi Vakil	Stanford University, USA
Roger Heath-Brown	Oxford University, UK	Michel van den Bergh	Hasselt University, Belgium
Craig Huneke	University of Virginia, USA	Marie-France Vignéras	Université Paris VII, France
Kiran S. Kedlaya	Univ. of California, San Diego, USA	Kei-Ichi Watanabe	Nihon University, Japan
János Kollár	Princeton University, USA	Efim Zelmanov	University of California, San Diego, USA
Yuri Manin	Northwestern University, USA	Shou-Wu Zhang	Princeton University, USA
Philippe Michel	École Polytechnique Fédérale de Lausanne		

## PRODUCTION

[production@msp.org](mailto:production@msp.org)

Silvio Levy, Scientific Editor

---

See inside back cover or [msp.org/ant](http://msp.org/ant) for submission instructions.

---

The subscription price for 2015 is US \$255/year for the electronic version, and \$440/year (+\$55, if shipping outside the US) for print and electronic. Subscriptions, requests for back issues and changes of subscribers address should be sent to MSP.

---

Algebra & Number Theory (ISSN 1944-7833 electronic, 1937-0652 printed) at Mathematical Sciences Publishers, 798 Evans Hall #3840, c/o University of California, Berkeley, CA 94720-3840 is published continuously online. Periodical rate postage paid at Berkeley, CA 94704, and additional mailing offices.

---

ANT peer review and production are managed by EditFLOW<sup>®</sup> from MSP.

PUBLISHED BY

 **mathematical sciences publishers**  
nonprofit scientific publishing

<http://msp.org/>

© 2015 Mathematical Sciences Publishers

# Algebra & Number Theory

Volume 9    No. 10    2015

---

Equivariant torsion and base change	2197
MICHAEL LIPNOWSKI	
Induction parabolique et $(\varphi, \Gamma)$ -modules	2241
CHRISTOPHE BREUIL	
On the normalized arithmetic Hilbert function	2293
MOUNIR HAJLI	
The abelian monoid of fusion-stable finite sets is free	2303
SUNE PRECHT REEH	
Polynomial values modulo primes on average and sharpness of the larger sieve	2325
XUANCHENG SHAO	
Bounds for Serre's open image theorem for elliptic curves over number fields	2347
DAVIDE LOMBARDO	
On 0-cycles with modulus	2397
AMALENDU KRISHNA	