

Pacific Journal of Mathematics

ÜBER ABBILDUNGEN VON MENGEN

MIROSLAV NOVOTNÝ

ÜBER ABBILDUNGEN VON MENGEN

MIROSLAV NOVOTNÝ

1. **Einleitung.** Im Jahre 1952 habe ich folgendes Problem gelöst: Gegeben sind die Mengen M, N und die Abbildung f der Menge M in sich und die Abbildung g der Menge N in sich. Es sind alle solchen Abbildungen F der Menge M in die Menge N zu konstruieren, dass $F[f(x)] = g[F(x)]$ für jedes $x \in M$ gilt. Dieses Ergebnis erschien in einer tschechisch geschriebenen Arbeit [4], welche daher den Mathematikern schwer verständlich war. Damit lässt sich erklären, dass indessen einige Arbeiten erschienen sind, welche Spezialfälle des obigen Problems behandeln ohne meine Lösung anzuwenden: So hat sich M. W. Weaver mit dem Falle beschäftigt, in welchem $M = N$, M endlich und f eineindeutig war [5]; S. Prešić hat den Fall behandelt, in welchem f eine eineindeutige Abbildung der Menge M auf sich und g die identische Abbildung der Menge N auf sich war [3].

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist meine Lösung des Problems deutsch erscheinen zu lassen und zu zeigen, wie aus meiner Lösung die Lösung der Probleme von Weaver und von Prešić folgt. Ferner ergeben sich aus meinem Hauptsatz auch einige Resultate, die sich in Burnsid's Buch [1] befinden. Ich will auch darauf hinweisen, dass aus meinem Hauptsatz die Konstruktion aller Homomorphismen einer gegebenen unären Algebra in eine gegebene unäre Algebra folgt, was ein Beitrag zu der in [2] von J. G. Marica und S. J. Bryant behandelten Problematik ist.

Übliche Begriffe und Symbolik der Mengenlehre werden als bekannt vorausgesetzt. \emptyset ist die leere Menge, $\{x\}$ ist die Menge, die x als einziges Element enthält. Ist M eine Menge, f eine Abbildung dieser Menge, E eine Eigenschaft, welche die Elemente von M entweder haben oder nicht haben, so ist $\{f(x) | E(x)\}$ die Menge aller $f(x)$, für welche $E(x)$ richtig ist. Ist M eine Menge, so wird unter einer Zerlegung Z auf dieser Menge ein System von nicht leeren paarweise fremden Teilmengen von M verstanden, für welches $\bigcup_{x \in Z} T = M$ gilt.

Ist f eine Abbildung der Menge M in die Menge N , $y \in N$ ein beliebiges Element, so setzen wir $f_{-1}(y) = \{x | x \in M, f(x) = y\}$. Ist $T \subseteq M$, $U \subseteq N$, so wird $f(T) = \{f(x) | x \in T\}$, $f_{-1}(U) = \{x | x \in M, f(x) \in U\}$ gesetzt. Ist $P \subseteq M$, so ist f_P eine solche Abbildung der Menge P , dass $f_P(x) = f(x)$ für jedes $x \in P$ gilt.

\bar{P} ist die Mächtigkeit der Menge P , $\bar{\alpha}$ die Mächtigkeit der Ordinalzahl α . Mit ω bezeichnen wir die kleinste unendliche Ordinalzahl.

2. **Hauptsatz über Abbildungen.** In diesem Absatz bezeichnen

wir mit M, N stets dasselbe Paar von nicht leeren Mengen, mit ∞ die kleinste Ordinalzahl, für welche $\overline{\infty} > \max(\overline{M}, \overline{N})$ ist. Es sei ferner f eine Abbildung der Menge M in sich, g eine Abbildung der Menge N in sich.

Wir bezeichnen mit f_0 die identische Abbildung der Menge M . Es sei $m > 0$ eine beliebige ganze Zahl; wir nehmen an, dass die Abbildung f_{m-1} definiert ist. Wir setzen $f_m(x) = f[f_{m-1}(x)]$ für jedes $x \in M$.

DEFINITION 1. Für die Elemente $x, y \in M$ setzen wir $x \rho_f y$ genau dann, wenn es solche ganzen Zahlen $m \geq 0, n \geq 0$ gibt, dass $f_m(x) = f_n(y)$ gilt. Man sieht leicht ein, dass ρ_f eine reflexive, transitive und symmetrische Relation ist; daher definiert sie eine Zerlegung Z auf der Menge M .

2.1. HILFSSATZ. Aus $T \in Z_f$ folgt $f(T) \subseteq T, f_{-1}(T) \subseteq T$.

DEFINITION 2. Es sei $x \in M$.

(a) Wenn es zwei solche ganzen Zahlen $0 \leq m < n$ gibt, dass $f_m(x) = f_n(x)$ ist, so ist die Menge der Elemente, welche in der Folge $f_0(x), f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x), \dots$ unendlich oft eintreten, nicht leer und endlich. Diese Menge soll *Zyklus des Elementes x* heißen; es sei $R_f(x)$ die Kardinalzahl des Zyklus.

(b) Wenn die Elemente $f_0(x), f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x), \dots$ untereinander verschieden sind, so setzen wir $R_f(x) = 0$.

Die Zahl $R_f(x)$ heiße *Rang des Elementes x* .

2.2. HILFSSATZ. Es sei $T \in Z_f$. Dann haben alle Elemente $x \in T$ denselben Rang; ist überdies noch $R_f(x) > 0$, so haben sie auch denselben Zyklus.

Beweis. Es sei $x_1, x_2 \in T$. Die Folgen $f_0(x_1), f_1(x_1), f_2(x_1), \dots, f_n(x_1), \dots; f_0(x_2), f_1(x_2), f_2(x_2), \dots, f_n(x_2), \dots$ haben dieselben Elemente bis auf endlich viele Ausnahmen.

DEFINITION 3. Es sei $T \in Z_f$. Der gemeinsame Rang aller Elemente der Klasse T wird *Rang der Klasse T* heißen und wird mit $R_f(T)$ bezeichnet.

Ist $R_f(T) > 0$, so wird der gemeinsame Zyklus aller Elemente der Klasse T *Zyklus der Klasse T* heißen.

DEFINITION 4. Das Element $x \in M$ heiße Element mit der Eigenschaft π , wenn es eine solche Folge $\{x_n\}_{n < \omega}$ gibt, dass $x_n \in M, f(x_1) = x$ und $f(x_{n+1}) = x_n$ für jede natürliche Zahl n ist. Wir bezeichnen mit A die Menge aller Elemente mit der Eigenschaft π ; wir setzen $B =$

$M - A$. Ferner setzen wir $B_0 = \{x \mid x \in B, f_{-1}(x) = \emptyset\}$. Es sei α eine beliebige Ordinalzahl; wir nehmen an, dass die Menge B_λ für jedes $\lambda < \alpha$ definiert ist. Wir setzen

$$B_\alpha = \{x \mid x \in B - \bigcup_{\lambda > \alpha} B_\lambda, f_{-1}(x) \subseteq \bigcup_{\lambda < \alpha} B_\lambda\}.$$

2.3. HILFSSATZ. *Es gibt eine solche Ordinalzahl $\vartheta < \infty$, dass $B = \bigcup_{\lambda < \vartheta} B_\lambda$. Dabei sind die Mengen B_λ zueinander fremd.*

Beweis. Wir bezeichnen mit ϑ die kleinste Ordinalzahl, für welche $B_\vartheta = \emptyset$ ist. Es ist offenbar $\bar{\vartheta} \leq \bar{B}$ und $\bigcup_{\lambda < \vartheta} B_\lambda \subseteq B$. Wäre $x \in B - \bigcup_{\lambda < \vartheta} B_\lambda$, so gäbe es in der Menge $f_{-1}(x)$ mindestens ein Element $x_1 \in B - \bigcup_{\lambda < \vartheta} B_\lambda$. Durch Induktion beweist man leicht, dass das Element x die Eigenschaft π hat, also ist $x \in A$, was ein Widerspruch ist.

DEFINITION 5. Für jedes Element $x \in A$ setzen wir $S_f(x) = \infty$; Für jedes Element $x \in B_\alpha$ setzen wir $S_f(x) = \alpha$. Die Ordinalzahl $S_f(x)$ heiße *Stufe des Elementes x* .

2.4. HILFSSATZ. *Aus $S_f(x) \neq \infty$ folgt $S_f[f(x)] > S_f(x)$; aus $S_f(x) = \infty$ folgt $S_f[f(x)] = \infty$.*

Beweis. Aus $S_f(x) = \infty$ folgt $x \in A$, also $f(x) \in A$ und $S_f[f(x)] = \infty$. Ist $S_f(x) \neq \infty, S_f[f(x)] = \infty$, so ist die Behauptung richtig. Es sei $S_f(x) \neq \infty, S_f[f(x)] \neq \infty$. Dann ist $S_f[f(x)] > S_f(y)$ für jedes $y \in f_{-1}[f(x)]$, also auch für $y = x$.

DEFINITION 6. Es sei $T \in Z_f, x_0 \in T$ beliebig. Wir setzen $P_0(x_0) = \{f_m(x_0) \mid m = 0, 1, 2, \dots\}$. Wir nehmen an, dass die Mengen $P_0(x_0), P_1(x_0), \dots, P_n(x_0)$ definiert sind. Dann setzen wir

$$P_{n+1}(x_0) = f_{-1}[P_n(x_0)] - \bigcup_{k=0}^n P_k(x_0).$$

2.5. HILFSSATZ. *Es sei $T \in Z_f, x_0 \in T$ beliebig. Es ist $T = \bigcup_{n < \omega} P_n(x_0)$ und die Mengen $P_n(x_0)$ sind zueinander fremd.*

Es seien M, N Mengen, f eine Abbildung der Menge M in sich, g eine Abbildung der Menge N in sich. Mit ρ_f bzw. ρ_g wird die Relation, mit Z_f bzw. Z_g die Zerlegung, mit R_f bzw. R_g der Rang und mit S_f bzw. S_g die Stufe bezeichnet, welche mit Hilfe der Abbildung f bzw. g definiert wird.

DEFINITION 7. Es seien $T \in Z_f, T' \in Z_g$ Klassen. Die Klasse T'

heisse *zulässig zu der Klasse T* genau dann, wenn entweder

- (a) $R_g(T') \neq 0$, $R_g(T')$ ist ein Teiler von $R_f(T)$, oder
- (b) $R_g(T') = 0$, $R_f(T) = 0$ und es gibt ein Paar solcher Elemente $x_0 \in T$, $x'_0 \in T'$, dass $S_f[f_m(x_0)] \leq S_g[g_m(x'_0)]$ für jede ganze Zahl $m \geq 0$ richtig ist.

DEFINITION 8. Es seien M, N Mengen, f eine Abbildung der Menge M in sich, g eine Abbildung der Menge N in sich, F eine Abbildung der Menge M in die Menge N . Wenn $F[f(x)] = g[F(x)]$ für jedes $x \in M$ gilt, so werden wir sagen, dass *die Abbildung F die Abbildung f in die Abbildung g überführt*.

In den Hilfssätzen 2.6, 2.7, 2.8 und 2.9 wird vorausgesetzt, dass die Abbildung F die Abbildung f in die Abbildung g überführt.

2.6. HILFSSATZ. *Zu jeder Klasse $T \in Z_f$ gibt es eine solche Klasse $T' \in Z_g$, dass $F(T) \subseteq T'$ ist.*

Beweis. Ist $x', y' \in F(T)$, so gibt es solche Elemente $x, y \in T$, dass $F(x) = x'$, $F(y) = y'$. Es gibt solche ganzen Zahlen $m, n \geq 0$, dass $f_m(x) = f_n(y)$ ist. Daraus ergibt sich

$$g_m(x') = g_m[F(x)] = F[f_m(x)] = F[f_n(y)] = g_n[F(y)] = g_n(y'),$$

woraus sich $x' \rho_g y'$ ergibt. Also gibt es eine Klasse $T' \in Z_g$ mit der Eigenschaft $x', y' \in T'$. Also ist $F(T) \subseteq T'$.

2.7. HILFSSATZ. *Es sei $T \in Z_f$; $T' \in Z_g$ sei die Klasse, für welche $F(T) \subseteq T'$ ist. Dann ist entweder*

- (a) $R_g(T') \neq 0$ und $R_g(T')$ ist ein Teiler von $R_f(T)$, oder
- (b) $R_g(T') = 0$, $R_f(T) = 0$.

Beweis. Es sei $R_g(T') > 0$. Ist $R_f(T) = 0$, so ist die Behauptung richtig. Also sei $R_f(T) > 0$. Dann wird der Zyklus der Klasse T bei der Abbildung F auf den Zyklus von T' abgebildet. Daraus folgt leicht, dass $R_g(T')$ ein Teiler von $R_f(T)$ ist. Es sei $R_g(T') = 0$. Wäre $R_f(T) > 0$, so wäre das Bild des Zyklus von T ein Zyklus in T' , was ein Widerspruch ist.

2.8. HILFSSATZ. *Für jedes $x \in M$ ist $S_f(x) \leq S_g[F(x)]$.*

Beweis. Für $S_f(x) = 0$ ist die Behauptung klar. Wir nehmen an, dass die Behauptung für jedes Element x richtig ist, für welches $S_f(x) < \alpha \leq \infty$, $\alpha > 0$ gilt. Ferner nehmen wir an, dass es ein solches

Element x_0 gibt, dass $S_f(x_0) = \alpha$, $S_f(x_0) > S_o[F(x_0)]$ ist. Zwei Fälle sind möglich:

(a) Es sei $\alpha < \infty$. Wir nehmen ein beliebiges Element $y \in f_{-1}(x_0)$. Dann ist $S_f(y) < S_f(x_0) = \alpha$, also $S_f(y) \leq S_o[F(y)] \leq S_o\{g[F(y)]\} = S_o\{F[f(y)]\} = S_o[F(x_0)] < S_f(x_0) = \alpha < \infty$. Daraus folgt $S_o[F(y)] < S_o\{g[F(y)]\}$ nach 2.4. Aus diesen Relationen folgt $S_f(y) \leq S_o[F(y)] < S_o\{g[F(y)]\} = S_o[F(x_0)]$ für jedes $y \in f_{-1}(x_0)$. Daraus ergibt sich $S_f(x_0) \leq S_o[F(x_0)]$, was ein Widerspruch ist.

(b) Es sei $\alpha = \infty$. Dann hat x_0 die Eigenschaft π . Daraus folgt, dass $F(x_0)$ die Eigenschaft π hat. Also ist $S_o[F(x_0)] = \infty = S_f(x_0)$, was ein Widerspruch ist.

Also ist die Behauptung für jedes Element x richtig, für welches $S(x) = \alpha$ gilt.

2.9. HILFSSATZ. *Es sei $T \in Z_f$; es sei ferner $T' \in Z_o$ die Klasse, für welche $F(T) \subseteq T'$. Dann ist die Klasse T' zu der Klasse T zulässig.*

Der Beweis folgt aus 2.7 und 2.8. Man wählt $x_0 \in T$ beliebig und setzt $x'_0 = F(x_0)$.

In den Hilfssätzen 2.10 und 2.11 und in der Definition 9 wird vorausgesetzt, dass f eine Abbildung der Menge M in sich und g eine Abbildung der Menge N in sich ist.

2.10. HILFSSATZ. *Es sei $T \in Z_f$; es sei ferner $T' \in Z_o$ eine zu T zulässige Klasse. Dann gibt es solche Elemente $x_0 \in T$, $x'_0 \in T'$, dass $S_f[f_m(x_0)] \leq S_o[g_m(x'_0)]$ für jede ganze Zahl $m \geq 0$ gilt.*

Beweis. Ist $R_o(T') = 0$, so folgt die Behauptung aus der Definition 7. Ist $R_o(T') > 0$, so genügt es das Element x'_0 im Zyklus der Klasse T' zu wählen; es ist offenbar $S_o[g_m(x'_0)] = \infty$ für jede ganze Zahl $m \geq 0$.

2.11. HILFSSATZ. *Es sei $T \in Z_f$; es sei ferner $T' \in Z_o$ eine zu T zulässige Klasse. Es seien $y \in T$, $y' \in T'$ solche Elemente, dass $S_f(y) \leq S_o(y')$ gilt. Das Element $x \in f_{-1}(y)$ sei beliebig. Dann gibt es in der Menge $g_{-1}(y')$ mindestens ein solches Element x' , dass $S_f(x) \leq S_o(x')$ ist.*

Beweis. Ist $S_o(y') = \infty$, so gibt es offenbar ein Element $x' \in g_{-1}(y')$ mit der Eigenschaft $S_o(x') = \infty$. Es sei also $S_f(y) \leq S_o(y') < \infty$. Wäre $S_o(x') < S_f(x)$ für jedes $x' \in g_{-1}(y')$, so hätte man $S_o(x') < S_f(x) < S_f[f(x)] = S_f(y) \leq S_o(y') < \infty$ für jedes $x' \in g_{-1}(y')$ nach 2.4. Man hätte daher $S_o(y') \leq S_f(x) < S_o(y')$, was unmöglich ist. Also gibt es mindestens ein Element $x' \in g_{-1}(y')$ mit der Eigenschaft $S_o(x') \geq S_f(x)$.

DEFINITION 9. *Konstruktion K.* Es sei $T \in Z_f$ beliebig, $T' \in Z_o$

eine beliebige zu T zulässige Klasse. Es seien $x_0 \in T, x'_0 \in T'$ solche Elemente, dass $S_f[f_m(x_0)] \leq S_g[g_m(x'_0)]$ für jede ganze Zahl $m \geq 0$ gilt. Wir definieren $F[f_m(x_0)] = g_m(x'_0)$ für jede ganze Zahl $m \geq 0$; es ist dann $S_f(x) \leq S_g[F(x)]$ für jedes Element $x \in P_0(x_0)$. Wir nehmen an, dass wir schon $F(x)$ für jedes $x \in \bigcup_{k=0}^n P_k(x_0)$ so definiert haben, dass $S_f(x) \leq S_g[F(x)]$ gilt. Wenn die Menge $P_{n+1}(x_0)$ nicht leer ist, so definieren wir die Abbildung F auf dieser Menge folgendermassen:

Ist $x \in P_{n+1}(x_0)$, so ist $y = f(x) \in P_n(x_0)$ und das Element $F(y) = y'$ ist definiert. Wir setzen $F(x) = x'$, wo $x' \in g_{-1}(y')$ ein beliebiges Element ist, für welches $S_f(x) \leq S_g(x')$; ein solches gibt es nach 2.11.

2.12. HILFSSATZ. *Die durch Konstruktion K definierte Abbildung F überführt die Abbildung f_T in die Abbildung $g_{T'}$.*

Beweis. Zu jedem Element $x \in P_0(x_0)$ gibt es eine solche ganze Zahl $m \geq 0$, dass $x = f_m(x_0)$ gilt. Also ist $F[f(x)] = F[f_{m+1}(x_0)] = g_{m+1}(x'_0) = g\{F[f_m(x_0)]\} = g[F(x)]$. Wir nehmen jetzt an, dass die Gleichung $F[f(x)] = g[F(x)]$ für jedes $x \in \bigcup_{k=0}^n P_k(x_0)$ richtig ist. Es sei $x \in P_{n+1}(x_0)$. Also ist $F(x) = x' \in g_{-1}[F(y)]$, wo $y = f(x)$ ist. Daraus folgt $g[F(x)] = F(y) = F[f(x)]$.

2.13. HILFSSATZ. *Es sei f eine Abbildung der Menge M in sich, g eine Abbildung der Menge N in sich. Es sei $T \in Z_f, T' \in Z_g, F$ eine Abbildung, welche die Abbildung f_T in die Abbildung $g_{T'}$ überführt. Dann ist F durch die Konstruktion K definiert.*

Beweis. Nach 2.9 ist die Klasse T' zu T zulässig. Es sei $x_0 \in T$ beliebig; wir setzen $x'_0 = F(x_0) \in T'$. Dann ist $S_f[f_m(x_0)] \leq S_g[g_m(x'_0)]$ für jede ganze Zahl $m \geq 0$ nach 2.8. Ferner ist $F[f_m(x_0)] = g_m[F(x_0)] = g_m(x'_0)$ für jede ganze Zahl $m \geq 0$. Es sei $x \in P_{n+1}(x_0)$; wir setzen $y' = F[f(x)], F(x) = x'$. Es ist $x' \in g_{-1}(y')$ und $S_f(x) \leq S_g(x')$ nach 2.8.

DEFINITION 10. Es sei M eine Menge, Z eine Zerlegung dieser Menge. Für jedes $T \in Z$ sei F^T eine Abbildung der Menge T . Wir bezeichnen mit $\bigcup_{T \in Z} F^T$ eine solche Abbildung F der Menge M , dass $F(x) = F^T(x)$ für jedes $T \in Z$ und jedes $x \in T$ ist.

2.14. HAUPTSATZ. *Es seien M, N nicht leere Mengen, f eine Abbildung der Menge M in sich, g eine Abbildung der Menge N in sich.*

(A) *Es sei Φ eine solche Abbildung der Menge Z_f in die Menge Z_g , welche zu jeder Klasse $T \in Z_f$ eine zu T zulässige Klasse $\Phi(T) \in Z_g$ zuordnet. Es sei F^T eine beliebige durch die Konstruktion K definierte Abbildung der Menge T in die Menge $\Phi(T)$. Dann ist $\bigcup_{T \in Z_f} F^T$ eine Abbildung der Menge M , welche die Abbildung f in die Abbildung g*

überführt.

(B) Jede Abbildung, welche die Abbildung f in die Abbildung g überführt, kann durch die sub (A) beschriebene Konstruktion definiert werden.

Der Beweis folgt aus 2.12, 2.6, 2.9, 2.13.

DEFINITION 11. Es sei M eine nicht leere Menge, f, F Abbildungen dieser Menge in sich. Die Abbildung F heiße mit der Abbildung f in der Menge M vertauschbar, wenn $f[F(x)] = F[f(x)]$ für jedes $x \in M$ gilt.

Wenn wir $M = N, f = g$ in 2.14 setzen, so bekommen wir

2.15. SATZ. Es sei M eine nicht leere Menge, f eine Abbildung dieser Menge in sich.

(A) Es sei Φ eine solche Abbildung der Menge Z_f in sich, welche zu jeder Klasse $T \in Z_f$ eine zu T zulässige Klasse $\Phi(T) \in Z_f$ zuordnet. Es sei F^T eine beliebige durch die Konstruktion K definierte Abbildung der Menge T in die Menge $\Phi(T)$. Dann ist $\bigcup_{T \in Z_f} F^T$ eine mit f in M vertauschbare Abbildung.

(B) Jede mit f in M vertauschbare Abbildung kann durch die sub (A) beschriebene Konstruktion definiert werden.

3. Unäre Algebren. Es sei A eine nicht leere Menge, auf der eine einstellige Operation definiert ist, d.h. eine Operation, die zu jedem Element $x \in A$ genau ein Element $x^* \in A$ zuordnet. Dann heisst die Menge A unäre Algebra.¹ Es seien A, B unäre Algebren, F eine Abbildung der Menge A in die Menge B . Die Abbildung F heiße Homomorphismus der Algebra A in die Algebra B , wenn $F(x^*) = [F(x)]^*$ für jedes $x \in A$ gilt.

Also ist die unäre Algebra A die Menge A und eine Abbildung f dieser Menge in sich, welche durch die Gleichung $f(x) = x^*$ für jedes $x \in A$ definiert ist. Ähnlich ist die unäre Algebra B die Menge B und eine solche Abbildung g dieser Menge in sich, dass $g(x) = x^*$ für jedes $x \in B$ gilt. Ein Homomorphismus F der Algebra A in die Algebra B ist eine solche Abbildung der Menge A in die Menge B , dass $F[f(x)] = g[F(x)]$ für jedes $x \in A$ gilt; also ist F eine Abbildung, welche die Abbildung f in die Abbildung g überführt. Offenbar ist auch jede Abbildung, welche die Abbildung f in die Abbildung g überführt, ein Homomorphismus der Algebra A in die Algebra B .

Der Satz 2.14 ermöglicht zu unären Algebren A, B alle Homomorphismen der Algebra A in die Algebra B zu konstruieren.

¹ Vgl. [2].

4. Spezialfälle. Unter einer *Permutation der Menge M* verstehen wir eine eindeutige Abbildung dieser Menge auf sich. Ist f eine Permutation der Menge M , so ist auch die Abbildung f_m bei jeder ganzen Zahl $m \geq 0$ eine Permutation dieser Menge; mit f_{-m} werden wir die zu f_m inverse Permutation der Menge M bezeichnen. Also ist die Abbildung f_m für jede ganze Zahl m definiert.

(α) Es sei M eine endliche Menge, f eine Permutation der Menge M . Dann ist jede Klasse $T \in Z_f$ ein Zyklus und es ist daher $S_f(x) = \infty$ und $R_f(x) > 0$ für jedes $x \in M$. Für jede Klasse $T \in Z_f$ und jedes Element $x \in T$ ist offenbar $T = P_0(x)$.

Aus dem Satz 2.15 folgt daher:

4.1. SATZ. *Es sei M eine nicht leere endliche Menge, f eine Permutation dieser Menge.*

(A) *Es sei Φ eine Abbildung der Menge Z_f in sich, welche zu jeder Klasse $T \in Z_f$ eine solche Klasse $\Phi(T) \in Z_f$ zuordnet, dass $R_f[\Phi(T)]$ ein Teiler von $R_f(T)$ ist. Es seien $x_T \in T, x'_T \in \Phi(T)$ bei jedem $T \in Z_f$ beliebige Elemente. Wir setzen $F[f_m(x_T)] = f_m(x'_T)$ für jede ganze Zahl $m \geq 0$. Dann ist die Abbildung F auf M mit f vertauschbar.*

(B) *Jede mit f vertauschbare Abbildung kann durch die sub (A) beschriebene Konstruktion definiert werden.*

Das ist das Problem, welches von M. W. Weaver gelöst wurde.

Die nach (A) konstruierte Abbildung F ist offenbar genau dann eine Permutation der Menge M , wenn die Abbildung Φ eindeutig ist und die Klassen $T, \Phi(T)$ immer gleiche Mächtigkeiten haben. Also folgt

4.2. SATZ. *Es sei M eine nicht leere endliche Menge, f eine Permutation dieser Menge.*

(A) *Es sei Φ eine Permutation der Menge Z_f , welche zu jeder Klasse $T \in Z_f$ eine Klasse $\Phi(T) \in Z_f$ von gleicher Mächtigkeit zuordnet. Es seien $x_T \in T, x'_T \in \Phi(T)$ bei jedem $T \in Z_f$ beliebige Elemente. Wir setzen $F[f_m(x_T)] = f_m(x'_T)$ für jede ganze Zahl $m \geq 0$. Dann ist F eine Permutation der Menge M , die mit f vertauschbar ist.*

(B) *Jede mit f vertauschbare Permutation kann durch die sub (A) beschriebene Konstruktion definiert werden.*

Ist f in 4.2. eine reguläre Permutation der Menge M (vgl. [4], S. 7), so haben alle Klassen $T \in Z_f$ dieselbe Mächtigkeit; also ist Φ eine beliebige Permutation der Menge Z_f . Also:

4.3. SATZ. *Es sei M eine nicht leere endliche Menge, f eine reguläre Permutation dieser Menge.*

(A) *Es sei Φ eine beliebige Permutation der Menge Z_f . Es seien $x_T \in T, x'_T \in \Phi(T)$ bei jedem $T \in Z_f$ beliebige Elemente. Wir setzen $F[f_m(x_T)] = f_m(x'_T)$ für jede ganze Zahl $m \geq 0$. Dann ist F eine Permutation der Menge M , die mit f vertauschbar ist.*

(B) *Jede mit f vertauschbare Permutation kann durch die sub (A) beschriebene Konstruktion definiert werden.*

Dieses Resultat befindet sich in Burnsid's Buch [4], S. 215–216 in einer anderen Formulation.

Ist f in 4.3 eine zirkuläre Permutation der Menge M (vgl. [4], S. 7), so hat Z_f nur eine Klasse $T = M$. Dann ist $x_T \in T, x'_T \in T$ beliebig und es gibt eine solche ganze Zahl $n \geq 0$, dass $x'_T = f_n(x_T)$. Es ist $F[f_m(x_T)] = f_m(x'_T) = f_m[f_n(x_T)] = f_n[f_m(x_T)]$ für jede ganze Zahl $m \geq 0$; also ist $F(x) = f_n(x)$ für jedes Element $x \in M$. Also gilt

4.4. SATZ. *Es sei M eine nicht leere endliche Menge, f eine zirkuläre Permutation dieser Menge.*

(A) *Zu jeder mit f vertauschbaren Permutation F der Menge M gibt es eine solche ganze Zahl $n \geq 0$, dass $F = f_n$ ist.*

(B) *Bei jeder ganzen Zahl $n \geq 0$ ist f_n mit f auf M vertauschbar.*

Dieses Resultat befindet sich auch in Burnsid's Buch [4], S. 8, Ex. 4.

(β) Es seien M, N nicht leere Mengen, f eine Abbildung der Menge M in sich, i die identische Abbildung der Menge N auf sich. Dann besteht jede Klasse der Zerlegung Z_i aus genau einem Punkte und es ist $S_i(x) = \infty$ für jedes Element $x \in N$. Ist $T \in Z_f$ eine beliebige Klasse, so ist zu ihr jede Klasse $T' \in Z_i$ zulässig. Für jedes $x \in M$ sei $T(x)$ die Klasse $T \in Z_f$, für welche $x \in T$ gilt. Aus 2.14 folgt:

4.5. SATZ. *Es seien M, N nicht leere Mengen, f eine Abbildung der Menge M in sich.*

(A) *Es sei Φ eine beliebige Abbildung der Menge Z_f in die Menge N . Wir setzen $F(x) = \Phi[T(x)]$. Dann ist*

$$F[f(x)] = F(x) \tag{*}$$

für jedes $x \in M$.

(B) *Jede Abbildung F der Menge M in die Menge N , welche die Bedingung (*) erfüllt, kann durch die sub (A) beschriebene Konstruktion definiert werden.*

DEFINITION 12. Es seien M, N nicht leere Mengen, f eine Abbildung der Menge in sich. Es sei P eine solche beliebige fest gegebene Abbildung des Systems aller Teilmengen der Menge N auf die Menge N , dass $P(\{x\}) = x$ für jedes Element $x \in N$ gilt.

(A) Es sei Φ eine beliebige Abbildung der Menge Z_f in die Menge N . Für jedes $x \in M$ setzen wir $Q(x) = \Phi[T(x)]$. Dann ist Q eine Abbildung der Menge M in die Menge N . Wir setzen $Q = K(\Phi)$.

(B) Es sei Q eine beliebige Abbildung der Menge M in die Menge N . Für jedes $T \in Z_f$ ist $\bigcup_{x \in T} \{Q(x)\} \subseteq N$; also ist $P[\bigcup_{x \in T} \{Q(x)\}] \in N$.

Wir setzen $\Phi(T) = P[\bigcup_{x \in T} \{Q(x)\}]$. Dann ist Φ eine Abbildung der Menge Z_f in die Menge N . Wir setzen $\Phi = L(Q)$.

4.6. HILFSSATZ. *Es seien M, N nicht leere Mengen, f eine Abbildung der Menge M in sich, P eine solche Abbildung des Systems aller Teilmengen der Menge N auf die Menge N , dass $P(\{x\}) = x$ für jedes Element $x \in N$ gilt.*

Dann ist für jede Abbildung Φ der Menge Z_f in die Menge N die Formel $L[K(\Phi)] = \Phi$ richtig.

Beweis. Für jedes $T \in Z_f$ ist $\Phi(T) = \bigcup_{x \in T} \{\Phi[T(x)]\} = \bigcup_{x \in T} \{Q(x)\}$, wo $Q = K(\Phi)$ ist. Da die Menge $\bigcup_{x \in T} \{Q(x)\}$ genau ein Element hat, ist $\Phi(T) = P[\bigcup_{x \in T} \{Q(x)\}] = [L(Q)](T)$. Also ist $\Phi(T) = \{L[K(\Phi)]\}(T)$ für jedes $T \in Z_f$. Daraus ergibt sich $L[K(\Phi)] = \Phi$.

Es sei A die Menge aller Abbildungen der Menge Z_f in die Menge N , B die Menge aller Abbildungen der Menge M in die Menge N . Aus 4.6 folgt leicht, dass L eine Abbildung der Menge B auf die Menge A ist. Um also alle Abbildungen Φ der Menge Z_f in die Menge N zu bekommen genügt es in die Formel $\Phi(T) = P[\bigcup_{x \in T} \{Q(x)\}]$ alle Abbildungen Q der Menge M in die Menge N einzusetzen. Daraus folgt leicht

4.7. SATZ. *Es seien M, N nicht leere Mengen, f eine Abbildung der Menge M in sich, P eine solche Abbildung des Systems aller Teilmengen der Menge N auf die Menge N , dass $P(\{x\}) = x$ für jedes $x \in N$ gilt.*

(A) *Es sei Q eine beliebige Abbildung der Menge M in die Menge N . Die durch die Gleichung*

$$F(x) = P[\bigcup_{t \in T(x)} \{Q(t)\}]$$

definierte Abbildung F genügt der Gleichung

$$F[f(x)] = F(x) .$$

(B) *Jede Abbildung F der Menge M in die Menge N , welche die Bedingung (*) erfüllt, kann durch die sub (A) beschriebene Konstruktion definiert werden.*

Wenn f eine Permutation der Menge M ist, so kann jede Klasse

$T \in Z_f$ in der Form $\{f_m(x) | m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots\}$ geschrieben werden, wo $x \in M$ ist. Daraus folgt

4.8. SATZ. *Es seien M, N nicht leere Mengen, f eine Permutation der Menge M, P eine solche Abbildung des Systems aller Teilmengen der Menge N auf die Menge N , dass $P(\{x\}) = x$ für jedes $x \in N$ gilt.*

(A) *Es sei Q eine beliebige Abbildung der Menge M in die Menge N . Die durch die Gleichung $F(x) = P(\bigcup_{m=-\infty}^{+\infty} \{Q[f_m(x)]\})^2$ definierte Abbildung erfüllt die Bedingung*

$$F[f(x)] = F(x)$$

für jedes $x \in M$.

(B) *Jede Abbildung F der Menge M in die Menge N , welche die Bedingung (*) erfüllt, kann durch die sub (A) beschriebene Konstruktion definiert werden.*

Dieser Satz ist von S. Prešić bewiesen worden.

LITERATUR

1. W. Burnside, *Theory of Groups of Finite Order*, Cambridge University Press 1897.
2. J. C. Marica-S. J. Bryant, *Unary algebras*, Pacific J. Math., **10** (1960), 1347-1359.
3. S. Prešić, *Sur l'équation fonctionnelle $f(x) = f[g(x)]$* . Publ. Fac. Electrotechnique Univ. Belgrade, Ser. Mat. et Phys. **64** (1961), 29-31.
4. M. Novotný, *Sur un problème de la théorie des applications*, Publ. Fac. Sci. Univ. Masaryk, No **344** (1953), 53-64.
5. M. W. Weaver, *On the commutativity of a correspondence and a permutation*, Pacific J. Math., **10** (1960), 105-111.

² Hier haben die Symbole $+\infty, -\infty$ die übliche Bedeutung.

PACIFIC JOURNAL OF MATHEMATICS

EDITORS

RALPH S. PHILLIPS

Stanford University
Stanford, California

M. G. ARSOVE

University of Washington
Seattle 5, Washington

J. DUGUNDJI

University of Southern California
Los Angeles 7, California

LOWELL J. PAIGE

University of California
Los Angeles 24, California

ASSOCIATE EDITORS

E. F. BECKENBACH
T. M. CHERRY

D. DERRY
M. OHTSUKA

H. L. ROYDEN
E. SPANIER

E. G. STRAUS
F. WOLF

SUPPORTING INSTITUTIONS

UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA
CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
MONTANA STATE UNIVERSITY
UNIVERSITY OF NEVADA
NEW MEXICO STATE UNIVERSITY
OREGON STATE UNIVERSITY
UNIVERSITY OF OREGON
OSAKA UNIVERSITY
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

STANFORD UNIVERSITY
UNIVERSITY OF TOKYO
UNIVERSITY OF UTAH
WASHINGTON STATE UNIVERSITY
UNIVERSITY OF WASHINGTON
* * *
AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY
CALIFORNIA RESEARCH CORPORATION
SPACE TECHNOLOGY LABORATORIES
NAVAL ORDNANCE TEST STATION

Mathematical papers intended for publication in the *Pacific Journal of Mathematics* should be typewritten (double spaced), and the author should keep a complete copy. Manuscripts may be sent to any one of the four editors. All other communications to the editors should be addressed to the managing editor, L. J. Paige at the University of California, Los Angeles 24, California.

50 reprints per author of each article are furnished free of charge; additional copies may be obtained at cost in multiples of 50.

The *Pacific Journal of Mathematics* is published quarterly, in March, June, September, and December. Effective with Volume 13 the price per volume (4 numbers) is \$18.00; single issues, \$5.00. Special price for current issues to individual faculty members of supporting institutions and to individual members of the American Mathematical Society: \$8.00 per volume; single issues \$2.50. Back numbers are available.

Subscriptions, orders for back numbers, and changes of address should be sent to Pacific Journal of Mathematics, 103 Highland Boulevard, Berkeley 8, California.

Printed at Kokusai Bunken Insatsusha (International Academic Printing Co., Ltd.), No. 6, 2-chome, Fujimi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan.

PUBLISHED BY PACIFIC JOURNAL OF MATHEMATICS, A NON-PROFIT CORPORATION

The Supporting Institutions listed above contribute to the cost of publication of this Journal, but they are not owners or publishers and have no responsibility for its content or policies.

Pacific Journal of Mathematics

Vol. 13, No. 4

June, 1963

Dallas O. Banks, <i>Bounds for eigenvalues and generalized convexity</i>	1031
Jerrold William Bebernes, <i>A subfunction approach to a boundary value problem for ordinary differential equations</i>	1053
Woodrow Wilson Bledsoe and A. P. Morse, <i>A topological measure construction</i>	1067
George Clements, <i>Entropies of several sets of real valued functions</i>	1085
Sandra Barkdull Cleveland, <i>Homomorphisms of non-commutative *-algebras</i>	1097
William John Andrew Culmer and William Ashton Harris, <i>Convergent solutions of ordinary linear homogeneous difference equations</i>	1111
Ralph DeMarr, <i>Common fixed points for commuting contraction mappings</i>	1139
James Robert Dorroh, <i>Integral equations in normed abelian groups</i>	1143
Adriano Mario Garsia, <i>Entropy and singularity of infinite convolutions</i>	1159
J. J. Gergen, Francis G. Dressel and Wilbur Hallan Purcell, Jr., <i>Convergence of extended Bernstein polynomials in the complex plane</i>	1171
Irving Leonard Glicksberg, <i>A remark on analyticity of function algebras</i>	1181
Charles John August Halberg, Jr., <i>Semigroups of matrices defining linked operators with different spectra</i>	1187
Philip Hartman and Nelson Onuchic, <i>On the asymptotic integration of ordinary differential equations</i>	1193
Isidore Heller, <i>On a class of equivalent systems of linear inequalities</i>	1209
Joseph Hersch, <i>The method of interior parallels applied to polygonal or multiply connected membranes</i>	1229
Hans F. Weinberger, <i>An effectless cutting of a vibrating membrane</i>	1239
Melvin F. Janowitz, <i>Quantifiers and orthomodular lattices</i>	1241
Samuel Karlin and Albert Boris J. Novikoff, <i>Generalized convex inequalities</i>	1251
Tilla Weinstein, <i>Another conformal structure on immersed surfaces of negative curvature</i>	1281
Gregers Louis Krabbe, <i>Spectral permanence of scalar operators</i>	1289
Shige Toshi Kuroda, <i>Finite-dimensional perturbation and a representation of scattering operator</i>	1305
Marvin David Marcus and Afton Herbert Cayford, <i>Equality in certain inequalities</i>	1319
Joseph Martin, <i>A note on uncountably many disks</i>	1331
Eugene Kay McLachlan, <i>Extremal elements of the convex cone of semi-norms</i>	1335
John W. Moon, <i>An extension of Landau's theorem on tournaments</i>	1343
Louis Joel Mordell, <i>On the integer solutions of $y(y + 1) = x(x + 1)(x + 2)$</i>	1347
Kenneth Roy Mount, <i>Some remarks on Fitting's invariants</i>	1353
Miroslav Novotný, <i>Über Abbildungen von Mengen</i>	1359
Robert Dean Ryan, <i>Conjugate functions in Orlicz spaces</i>	1371
John Vincent Ryff, <i>On the representation of doubly stochastic operators</i>	1379
Donald Ray Sherbert, <i>Banach algebras of Lipschitz functions</i>	1387
James McLean Sloss, <i>Reflection of biharmonic functions across analytic boundary conditions with examples</i>	1401
L. Bruce Treybig, <i>Concerning homogeneity in totally ordered, connected topological space</i>	1417
John Wermer, <i>The space of real parts of a function algebra</i>	1423
James Juei-Chin Yeh, <i>Orthogonal developments of functionals and related theorems in the Wiener space of functions of two variables</i>	1427
William P. Ziemer, <i>On the compactness of integral classes</i>	1437